



CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 5 POSTI DI INFERMIERE PEDIATRICO A TEMPO PIENO

Ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 come modificato dall'art. 18 del Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97 e dall'art. 1, co. 145, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 si pubblicano:

- I criteri di valutazione della Commissione in merito alla prova scritta, alla prova pratica, alla prova orale e alla valutazione dei titoli;
- Le tracce delle prove scritte, pratiche ed orali.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA

- + 0,75 PUNTO PER OGNI RISPOSTA ESATTA
- 0 PUNTI PER RISPOSTE ERRATE, OMESSE O MULTIPLE
- MASSIMO 4,5 PUNTI PER OGNI RISPOSTA SINTETICA

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA PRATICA

- + 1 PUNTO PER OGNI RISPOSTA ESATTA
- 0 PUNTI PER RISPOSTE ERRATE, OMESSE O MULTIPLE
- MASSIMO 6 PUNTI PER OGNI RISPOSTA SINTETICA

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE

La valutazione della prova orale è stata operata in relazione al livello di conoscenza ed analisi dell'argomento trattato dimostrato dai candidati

CRITERI VALUTAZIONE TITOLI

- Come indicato nella sottostante tabella.





Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 5 posti di Infermiere Pediatrico a tempo pieno

CARRIERA (max 15,000 punti)

arrotonda periodi superiori ai 15 gg a 1 mesi

Cod.	Regola	Punti	x mesi	Tipo calcolo	Unità mis.	Omog.	Sovr.	% val.
100	Presso USL/PA nel profilo	1,200	12	PRC	mesi	Si	Si	100
101	Presso USL/PA nel profilo cat. superiore	1,200	12	PRC	mesi	Si	Si	100
102	Presso USL/PA nel profilo cat. inferiore	0,600	12	PRC	mesi	Si	Si	100
170	Servizio militare/civile funzioni inerenti	1,200	12	PRC	mesi	Si	Si	100
180	Presso case di cura convenzionate o accreditate nel profilo	1,200	12	PRC	mesi	Si	Si	25
181	Presso case di cura convenzionate o accreditate nel profilo cat. inferiore	0,600	12	PRC	mesi	Si	Si	25
199	Servizio non valutabile	0,000	12	PRC	mesi	Si	Si	100

ACCADEMICI E DI STUDIO (max 5,000 punti)

arrotonda periodi superiori ai 0 gg a 0 mesi

Cod.	Regola	Punti	x mesi	Tipo calcolo	Unità mis.	Omog.	Sovr.	% val.
200	Laurea Magistrale Scienze delle Professioni Sanitarie	2,000	0	N	n.	No	No	100
201	Dottorato di ricerca attinente	2,000	0	N	n.	No	No	100
202	Dottorato di ricerca NON attinente	1,000	0	N	n.	No	No	100
203	Master di I liv. attinenti al profilo/Certificato Abilitazione Funzioni Direttive	1,000	0	N	n.	No	No	100
204	Laurea Triennale/Master NON attinenti al profilo	0,250	0	N	n.	No	No	100





205	Diploma di Laurea vecchio Ord./Laurea Spec. o Magistrale NON attinenti al profilo	0,500	0	N	n.	No	No	100
206	Master di II livello attinenti al profilo	1,500	0	N	n.	No	No	100
207	Altra Laurea Triennale attinente oltre a quella prevista quale requisito di ammissione	1,000	0	N	n.	No	No	100
208	Diploma di laurea vecchio ordinamento/Laurea specialistica o magistrale attinente al profilo	1,000	0	N	n.	No	No	100
210	Diploma di specializzazione universitaria attinente	2,000	0	N	n.	No	No	100
215	Diploma di specializzazione universitaria NON attinente	1,000	0	N	n.	No	No	100
299	Titoli di studio ed accademici non valutabili	0,000	0	N	n.	No	No	100

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI (max 5,000 punti)

arrotonda periodi superiori ai 0 gg a 0 mesi

Cod.	Regola	Punti	x mesi	Tipo calcolo	Unità mis.	Omog.	Sovr.	% val.
301	Pubblicazioni su riviste con impact-factor	1,000	0	N	n.	No	No	100
302	Pubblicazioni su riviste indicizzate attinenti	0,500	0	N	n.	No	No	100
350	Abstract, poster comunicazioni a congressi	0,100	0	EVE	n.	No	No	100
360	Pubblicazioni su riviste NON indicizzate/capitoli di libro	0,100	0	N	n.	No	No	100
370	Lavori NON attinenti	0,000	0	N	n.	No	No	100
399	Lavori non valutabili	0,000	0	N	n.	No	No	100

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE (max 5,000 punti)

arrotonda periodi superiori ai 15 gg a 1 mesi



Cod.	Regola	Punti	x mesi	Tipo calcolo	Unità mis.	Omog.	Sovr.	% val.
400	Servizi prestati nel profilo a qualsiasi titolo non valutati in carriera presso Strutture Sanitarie Pubbliche o Convenzionate o IRCCS Privati	0,300	12	PRC	mesi	Si	No	100
401	Servizi prestati nel profilo a qualsiasi titolo non valutati in carriera presso Privati e strutture estere	0,150	12	PRC	mesi	Si	No	100
405	frequenza volontaria/Stage/Tirocinio quale infermiere pediatrico	0,000	12	PRC	mesi	Si	No	100
409	Altri Servizi prestati NON nel profilo a qualsiasi titolo	0,000	12	PRC	mesi	Si	Si	100
450	Corsi di Formazione, Agg.to Prof.le, Convegni ecc. (Partecipante/Tutor)	0,001	0	N	n.	No	No	100
451	Corsi di Formazione, Agg.to Prof.le, Convegni ecc. (Relatore/Responsabile Scientifico/Docente)	0,050	0	N	n.	No	No	100
452	PBLS - BLS conseguito negli ultimi due anni, corso antincendio 16 h. negli ultimi 5 anni, corso allattamento al seno OMS-UNICEF 20 h.	0,030	0	N	n.	No	No	100
453	PBLS D - BLS D conseguito negli ultimi due anni, corso allattamento al seno OMS-UNICEF 40 h.	0,050	0	N	n.	No	No	100
455	Altre Certificazioni di competenza Prof.le secondo standard Internazionali	0,050	0	N	n.	No	No	100
456	PTC ALS PALS ILS, ect	0,050	0	N	n.	No	No	100
457	Corsi di Perfezionamento a livello Universitario attinenti al profilo	0,030	0	N	n.	No	No	100
460	Partecipazione a Studi Clinici come coordinatore	0,100	0	N	n.	No	No	100
470	Membro Società Scientifiche	0,000	0	N	n.	No	No	100
475	premio scientifico/accademico	0,030	0	N	n.	No	No	100
480	Attività didattica attinente	0,100	12	PRC	mesi	Si	No	100
485	Titoli per i quali la Commissione ritiene di non attribuire alcun punteggio	0,000	0	N	n.	No	No	100



490	Titoli vari NON attinenti	0,000	0	N	n.	No	No	100
499	Titoli non valutabili	0,000	0	N	n.	No	No	100
800	=====	0,000	0	N	n.	No	No	100
900	Valutazione Complessiva della Commissione Esaminatrice	0,000	0	N	n.	No	No	100

TRACCE PROVE SCRITTE

PROVA SCRITTA N. 1

1- Nell'ambito dei 10 passi Unicef dell'Ospedale Amico dei Bambini il passo 4 corrisponde a:

- a) Mostrare alle madri come allattare e come mantenere la secrezione lattea anche nel caso in cui vengano separate dai neonati
- b) Incoraggiare l'allattamento al seno a richiesta tutte le volte che il neonato sollecita il nutrimento
- c) Definire un protocollo scritto per l'allattamento al seno da far conoscere a tutto il personale sanitario
- d) Mettere i neonati in contatto pelle a pelle con la madre immediatamente dopo la nascita per almeno un'ora e incoraggiare le madri a comprendere quando il neonato è pronto per poppare, offrendo aiuto se necessario

2- Quali sono gli ormoni dell'allattamento:

- a) Estrogeni e progesterone
- b) Prolattina e ossitocina
- c) LH e FSH
- d) Albumina e ossitocina

3- Quali farmaci si possono somministrare per via intradermica?

- a) antibiotici, antimicotici
- b) antitumorali, antiemetici
- c) test allergici, vaccini
- d) antivirali, stupefacenti





- 4- Quale tra le seguenti affermazioni sulla dermatite atopica è vera?
- è una malattia contagiosa
 - è caratterizzata clinicamente da lesioni eczematose
 - è una malattia autosomica recessiva
 - esordisce solo negli adolescenti
- 5- Uno studio clinico in doppio cieco significa che:
- sia il paziente che lo sperimentatore conoscono il trattamento
 - solo lo sperimentatore conosce il trattamento
 - né lo sperimentatore né il paziente conoscono il trattamento
 - solo il paziente conosce il trattamento
- 6- L'antidoto utilizzato in caso di avvelenamento con narcotici è:
- vitamina k
 - atropina
 - blu di metilene
 - naloxone
- 7- Qual è l'agente eziologico della scarlattina:
- Ceppi di Streptococcus Pyogenes
 - Parvovirus B19
 - Epstein-Barr
 - Escherichia-Coli
- 8- Che cos'è la maschera laringea?
- È un presidio di rianimazione indispensabile per il controllo delle vie aeree che può essere utilizzato come alternativa alla maschera facciale o al tubo endotracheale
 - È un presidio respiratorio in grado di garantire un sistema ad alta pressione intorno all'esofago
 - È un presidio respiratorio non raccomandato in età pediatrica
 - È un presidio indispensabile per consentire la somministrazione di farmaci antireflusso
- 9- Il neonato grande per l'età gestazionale (LGA)
- Ha un peso che rapportato all'età gestazionale è superiore al 90° percentile
 - Ha un peso che rapportato all'età gestazionale compreso tra il 75° e il 90° percentile



- c) Ha un peso che rapportato all'età gestazionale è inferiore al 90° percentile
- d) Ha un peso che rapportato all'età gestazionale compreso tra il 3° e 10° percentile

10- Rispetto al latte prodotto da donne a termine di gravidanza, quali di questi componenti sono presenti in maggiore concentrazione durante il primo mese di vita nel latte di donna che ha partorito pretermine?

- a) Ferro
- b) Vitamina k
- c) Fosforo
- d) Proteine

11- Per valutare il dolore in un neonato prematuro si utilizza la scala PIPP (Premature Infant Pain Profile). Quali sono gli indicatori considerati?

- a) Stato comportamentale, frequenza cardiaca, saturazione O₂, corrugamento fronte, strizzamento occhi, corrugamento solco naso-labiale
- b) Stato comportamentale, frequenza cardiaca, saturazione O₂, attività respiratoria corrugamento fronte, pressione arteriosa sistolica, riflesso pupillare
- c) Peso alla nascita, frequenza cardiaca, attività respiratoria, tono muscolare, reattività agli stimoli, corrugamento solco naso-labiale
- d) Refill capillare, attività respiratoria, saturazione O₂, peso alla nascita, tono muscolare, pianto

12- Secondo le indicazioni OMS-UNICEF i neonati dovrebbero essere allattati frequentemente. Indica quante volte nelle 24 ore un neonato dovrebbe essere allattato al seno

- a) 8- 12 volte
- b) 4 volte
- c) 4-6 volte
- d) 6-8 volte (non allattare dalle ore 24 alle 06 per permettere alla mamma e al bambino di riposare)

13- Per accertamento infermieristico si intende

- a) E' collegato all'etiologia della malattia da cui è affetto il paziente
- b) Raccolta sistematica di dati per accertare lo stato di salute del paziente
- c) Acquisizione del consenso da parte dei genitori a sottoporre il loro bambino ad accertamenti
- d) Riconoscimento di tutti i presidi di comune utilizzo

14- Cosa è e a cosa serve una PEG?





- a) Gastrostomia endoscopica percutanea. È una sonda che collega la parete addominale al lume gastrico e serve per consentire la nutrizione enterale in coloro che non possono alimentarsi per bocca
- b) È un drenaggio toracico che si ancora al parenchima polmonare senza necessità di fili di sutura
- c) È un monitoraggio cardiaco, specifico dell'attività contrattile
- d) È acronimo di "picco estemporaneo garantito" ed ha l'obiettivo di sincronizzare la ventilazione invasiva

15- Quale è l'unità di misura della glicemia?

- a) mg/dl
- b) mmHg
- c) mg/l
- d) g/mg

16- Quale affermazione è corretta quando si parla di "pallone autoinsufflante" (Ambu)

- a) viene utilizzato solo in caso di cardiopatia congenita
- b) viene utilizzato sempre senza maschera ventilatoria
- c) si rigonfia da solo dopo essere stato compresso anche senza fonte di gas
- d) non può mai essere utilizzato per la ventilazione in età pediatrica

17- Cosa si intende per lavaggio sociale delle mani

- a) frizionamento delle mani con soluzione idroalcolica
- b) utilizzato dall'equipe chirurgica e praticato con sostanze disinfettanti
- c) mira a eliminare la sporcizia e la flora transitorie o contaminante con l'impiego di acqua e sapone liquido
- d) può non essere effettuato se vengono utilizzati i guanti

18- Il catetere venoso ombelicale (COV) è:

- a) un dispositivo che viene inserito solitamente dall'infermiere pediatrico
- b) un accesso vascolare per la sola somministrazione di soluzione Glucosata 5%, in una delle due vene ombelicali, presenti fisiologicamente nel cordone ombelicale.
- c) un accesso vascolare immediato per stabilizzare le funzioni vitali attraverso la somministrazione di liquidi/emotrasfusioni/ farmaci e nutrizione parenterale totale.
- d) Un dispositivo che non viene mai utilizzato in situazioni di urgenza





- 19- Una fiala di midazolam contiene 20 mg in 4 ml, se la dose prescritta è di 5 mg quanti ml devo aspirare?
- 1 ml
 - 2 ml
 - 3 ml
 - 4 ml
- 20- Quale di queste affermazioni sulla somministrazione endovenosa di potassio cloruro (KCL) NON è corretta?
- lo stravasamento tissutale di potassio può causare grave danno tissutale
 - una delle indicazioni alla somministrazione endovenosa di potassio è l'ipokaliemia severa
 - il potassio deve essere possibilmente conservato in un armadio chiuso a chiave in contenitori su cui sia appostata la segnalazione diluire correttamente mortale se non diluito
 - la preparazione NON richiede il doppio controllo
- 21- Relativamente al sondino oro/naso gastrico in epoca neonatale, segna la risposta corretta
- si consiglia la via naso gastrica rispetto a quella oro gastrica quando il bambino ha raggiunto una buona stabilità respiratoria e quando si vuole facilitare la suzione al biberon
 - è un dispositivo che viene posizionato sempre dal chirurgo
 - è una procedura che viene eseguita sterilmente
 - è il dispositivo migliore per garantire la nutrizione enterale ai neonati con atresia esofagea con monconi separati
- 22- Per quanto riguarda il supporto dello sviluppo sensoriale nel neonato pretermine, gli Standard Organizzativi per l'assistenza perinatale suggeriscono
- utilizzare solo alti livelli di illuminazione per favorire l'apertura degli occhi
 - non offrire mai il ciuccio per stimolare la suzione non nutritiva
 - non utilizzare tecniche di contenimento (es. wrapping)
 - utilizzare un tocco fermo e dolce durante tutte le interazioni
- 23- L'acronimo NCPAP sta per
- Nasal Continuous Peep Airway Pressure
 - Nasal Continuous Positive Airway Pressure
 - Non-invasive Continuous Positive Airway Pressure





d) Nasal Continuous Positive Air leak Pressure

24- Il triage è un sistema di valutazione rapida degli assistiti che accedono in pronto soccorso, il codice giallo viene attribuito a:

- a) soggetto acuto (potenziale pericolo di vita)
- b) soggetto urgente (immediato pericolo di vita)
- c) soggetto stabile
- d) soggetto non urgente

25- Cosa s'intende per onfalocele?

- a) Patologia in cui una parte dell'intestino è erniata all'interno dell'ombelico
- b) Infiammazione del cordone ombelicale
- c) Patologia in cui non è necessario l'intervento chirurgico
- d) Malformazione acquisita

26- Dovendo somministrare i 3/5 di una fiala da 1gr di Ampicillina, quanti mg si somministrano?

- a) 500 mg
- b) 200 mg
- c) 250 mg
- d) 600 mg

27- Nel PBLIS-D cosa prevede la fase "A"

- a) Nel lattante la posizione che garantisce la miglior apertura delle vie aeree è la posizione neutra
- b) Effettuare estensione del capo-sollevamento del mento in caso di traumatismi del collo
- c) Introdurre le dita "alla cieca" nel cavo orale
- d) Girare verso destra o sinistra la testa del bambino

28- Quanti parametri valuta Il punteggio di Apgar?

- a) 2
- b) 5
- c) 7
- d) 3





- 29 - Quale affermazione è corretta quando si parla di iperbilirubinemia neonatale?
- a) Viene utilizzata esclusivamente la fototerapia per il trattamento
 - b) Qualora il livello elevato di bilirubina richieda una terapia, generalmente si ricorre alla fototerapia e, talvolta, ad exanguinotrasfusione
 - c) È indicato l'avvolgimento del neonato con un telino per evitare la dispersione di calore
 - d) I trattamenti sono da applicare solo ai nati da parto cesareo
- 30) Cosa valuta la scala di Braden Q?
- a) valuta il dolore acuto nel neonato pretermine
 - b) valuta il rischio di insorgenza di lesioni da pressione a causa di condizioni neurologiche e immobilizzazione
 - c) valuta il grado distress respiratorio del bambino in età prescolare
 - d) valuta il rischio di sindrome da astinenza neonatale

PROVA SCRITTA N. 2

- 1) Nell'ambito dei 10 passi Unicef dell'Ospedale Amico del Bambino il passo 10 corrisponde a:
- a. Incoraggiare l'allattamento al seno a richiesta tutte le volte che il neonato sollecita il nutrimento
 - b. Definire un protocollo scritto per l'allattamento al seno da far conoscere a tutto il personale sanitario
 - c. Mettere i neonati in contatto pelle a pelle con la madre immediatamente dopo la nascita per almeno un'ora e incoraggiare le madri a comprendere quando il neonato è pronto per poppare, offrendo aiuto se necessario
 - d. Promuovere la collaborazione tra il personale della struttura, il territorio, i gruppi di sostegno e la comunità locale per creare reti di sostegno a cui indirizzare le madri alla dimissione dall'ospedale
- 2) Quale delle seguenti rappresenta una controindicazione alla somministrazione di una terapia rettale
- a. nausea
 - b. vomito
 - c. diarrea
 - d. bronchite



- 3) Quali dei seguenti parametri non è compreso nell'attribuzione del punteggio di Apgar
 - a. frequenza cardiaca
 - b. colorito cutaneo
 - c. reattività
 - d. pressione arteriosa

- 4) Cosa sono gli operatori booleani?
 - a. Operatori informatici per diminuire il numero di articoli pertinenti
 - b. Strumenti statistici
 - c. Operatori logici per combinare tra loro termini diversi durante una ricerca bibliografica
 - d. Operatori matematici per creare tabelle di randomizzazione

- 5) Qual è il test utilizzato per la valutazione della scoliosi?
 - a. Test di Adams
 - b. Test di Lachmann
 - c. Test di Allen
 - d. Test di Dandy

- 6) L'antidoto utilizzato per neutralizzare la somministrazione eccessiva di paracetamolo è:
 - a. vitamina k
 - b. blu di metilene
 - c. naloxone
 - d. L'N-acetilcisteina

- 7) Qual è l'agente eziologico della mononucleosi :
 - a. Ceppi di Streptococcus Pyogenes
 - b. Parvovirus B19
 - c. Epstein-Barr
 - d. Rotavirus

- 8) Quale dispositivo tra i seguenti è controindicato per la somministrazione di ossigeno nel bambino con ostruzione nasale
 - a. maschera facciale semplice





- b. cannula nasale
 - c. maschera di Venturi
 - d. tenda per ossigeno
- 9) Il neonato piccolo per l'età gestazionale (SGA)
- a. Ha un peso che rapportato all'età gestazionale è uguale al 90° percentile
 - b. Ha un peso che rapportato all'età gestazionale è inferiore al 90° percentile
 - c. Ha un peso che rapportato all'età gestazionale è inferiore al 10° percentile
 - d. Ha un peso che rapportato all'età gestazionale è compreso tra il 25° e 50° percentile
- 10) La sindrome di down corrisponde a:
- a. trisomia 13
 - b. trisomia 18
 - c. trisomia 21
 - d. trisomia 15
- 11) Per valutare il dolore prolungato in un neonato prematuro si utilizza la scala EDIN (Echelle Douleur Inconfort Nouveau-né). Quale tra i seguenti è uno tra gli indicatori che vengono presi in considerazione ?
- a. Espressione facciale
 - b. Pressione arteriosa
 - c. Peso alla nascita
 - d. Frequenza cardiaca
- 12) Cosa si intende per allattamento al seno esclusivo?
- a. poppate intercalate a somministrazioni di latte artificiale
 - b. allattamento con aggiunta di bevande
 - c. alimentazione esclusivamente con latte materno
 - d. episodiche poppate al seno senza valore energetico significativo
- 13) Il processo di assistenza è:
- a. caratterizzato da un procedimento logico, sistematico e dinamico
 - b. un metodo per risolvere i problemi dell'infermiere
 - c. l'equivalente della cartella clinica infermieristica



d. sinonimo di near miss

- 14) Relativamente alla cura di una colostomia intestinale indica la risposta corretta
- Il foro nella placca deve essere più grande di almeno 2 cm rispetto allo stoma per permettere di ispezionare la cute peristomale
 - Lo stoma deve essere sempre deterso con garza imbevuta di disinfettante
 - Durante la gestione della stomia intestinale è necessario utilizzare solo guanti e garze sterili
 - Possono essere utilizzati sistemi di raccolta mono pezzo o a due pezzi
- 15) Quale è l'unità di misura in cui si riportano i valori della pressione arteriosa?
- mg/dl
 - mmHg
 - mg/ml
 - g/dl
- 16) Quale affermazione è corretta quando si parla di "pallone flusso dipendente" (va e vieni)
- richiede una fonte di gas compresso per l'insufflazione
 - viene utilizzato sempre senza maschera ventilatoria
 - viene utilizzato per la ventilazione in alta frequenza oscillatoria
 - non può essere utilizzato nei neonati pretermine
- 17) Il "lavaggio chirurgico" delle mani è
- frizionamento delle mani con soluzione idroalcolica
 - utilizzato dall'equipe chirurgica e praticato con sostanze disinfettanti
 - effettuato con l'impiego di acqua e sapone liquido
 - effettuato con soluzione fisiologica 0,9%
- 18) Il catetere arterioso ombelicale (CAO)
- è un dispositivo che viene inserito sterilmente dall'infermiere pediatrico
 - è un accesso vascolare che può essere posizionato in una delle due arterie ombelicali, presenti fisiologicamente nel cordone





- c. viene solitamente posizionato dopo il primo mese di vita
d. non può mai essere utilizzato per la rilevazione della pressione arteriosa
- 19) Una fiala di midazolam contiene 20 mg in 4 ml, se la dose prescritta è di 15 mg quanti ml devo aspirare?
- 1 ml
 - 2 ml
 - 3 ml
 - 4 ml
- 20) Quale di queste affermazioni sulla somministrazione endovenosa di potassio cloruro è corretta
- lo stravasamento tissutale di potassio non causa mai danno tissutale
 - una delle indicazioni alla somministrazione endovenosa di potassio cloruro è l'iponatriemia severa
 - il potassio deve essere possibilmente conservato separato da altri farmaci in un armadio chiuso a chiave in contenitori che abbiano la segnalazione di allarme "diluire prima della somministrazione: mortale se infuso non diluito"
 - la preparazione non richiede il doppio controllo
- 21) Secondo il metodo "NEMU" come si determina la misura in cui posizionare il sondino naso gastrico?
- la lunghezza è determinata dalla somma della distanza tra narice e lobo dell'orecchio e dalla distanza di quest'ultimo al punto mediano del tratto che va da processo xifoideo all'ombelico
 - la lunghezza è determinata dalla somma della distanza tra narice e processo xifoideo
 - la lunghezza è determinata dalla somma della distanza tra spalla e ombelico
 - la lunghezza è determinata dal rapporto tra peso e lunghezza del neonato
- 22) Per quanto riguarda la protezione del sonno nel neonato pretermine, gli Standard Organizzativi per l'assistenza perinatale suggeriscono
- utilizzare copri incubatrice e tendine per i lettini, per proteggere il bambino dalla luce diretta
 - promuovere un ambiente con alti livelli sonori
 - evitare la marsupio terapia durante il pomeriggio
 - promuovere, prima della dimissione, la posizione prona per la protezione del sonno





23) Cosa s'intende per BFHI

- a. Birth Friendly Hospital Initiative
- b. Baby Friendly Hospital Inprinting
- c. Baby Friendly Hospital Initiative
- d. Baby Friendly Hospital Importance

24) Il triage è un sistema di valutazione rapida degli assistiti che accedono in pronto soccorso, il codice rosso viene attribuito a:

- a. soggetto acuto (potenziale pericolo di vita)
- b. soggetto stabile
- c. soggetto critico (immediato pericolo di vita)
- d. soggetto non urgente

25) Cosa s'intende per gastroschisi?

- a. Difetto di circolazione dovuto ad anomalie della forma del cordone ombelicale
- b. Patologia in cui non è necessario l'interno chirurgico
- c. Difetto paraombelicale completo della parete addominale con eviscerazione di anse non coperte da peritoneo
- d. Malformazione acquisita

26) Dovendo somministrare i 2/5 di una fiala da 1gr di Ampicillina, quanti mg si somministrano?

- a. 600 mg
- b. 100 mg
- c. 200 mg
- d. 400 mg

27) Nel PBLIS-D cosa prevede la fase "B"

- a. Nel lattante la posizione che garantisce la miglior apertura delle vie aeree è la posizione iperestesa
- b. Effettuare estensione del capo-sollevamento del mento in caso di traumatismi del collo
- c. valutazione della respirazione mediante il guardo, ascolto e sento (GAS)
- d. Girare verso destra o sinistra la testa del bambino





- 28) Nel punteggio di Apgar i parametri di valutazione sono:
- frequenza cardiaca, attività respiratoria, colorito cutaneo, tono muscolare, reattività agli stimoli
 - frequenza cardiaca, attività respiratoria, colorito cutaneo, pressione arteriosa, reattività agli stimoli
 - frequenza cardiaca, glicemia, colorito cutaneo, pressione arteriosa, reattività agli stimoli
 - attività respiratoria, pervietà delle vie aeree, tono muscolare, frequenza cardiaca, temperatura corporea
- 29) La malattia delle membrane ialine (MMJ) è dovuta all'insufficiente produzione da parte delle cellule delle vie respiratorie di una sostanza chiamata "surfattante", sostanza fondamentale per tenere aperte le vie respiratorie. Rappresenta quindi la principale malattia respiratoria del nato pretermine. Quale risposta NON è vera?
- La somministrazione di surfattante esogeno avviene tramite tecnica INSURE o tramite tubo endotracheale, se già in sede.
 - Il surfattante è una miscela di proteine e fosfolipidi ad azione tensioattiva prodotta dalle cellule che rivestono gli alveoli polmonari a partire dalla 24esima-28esima settimana di gestazione
 - la MMJ è una condizione clinica caratterizzata da difficoltà respiratoria con tachipnea, retrazioni toraciche e cianosi ingravescente
 - La MMJ è un'assenza di respiro superiore ai 20 secondi o una pausa più breve, ma accompagnata da bradicardia e desaturazione
- 30) Quali funzioni valuta la Glasgow Coma Scale (GCS)?
- motoria, verbale, respiratoria
 - respiratoria, verbale, apertura occhi
 - motoria, verbale, apertura degli occhi
 - respiratoria, cardiocircolatoria, verbale

PROVA SCRITTA N. 3

- 1) Nell'ambito dei 10 passi Unicef dell'Ospedale Amico dei Bambini il passo 8 corrisponde a:
- Mostrare alle madri come allattare e come mantenere la secrezione lattea anche nel caso in cui vengano separate dai neonati
 - Incoraggiare l'allattamento al seno a richiesta tutte le volte che il neonato sollecita il nutrimento





- c. Definire un protocollo scritto per l'allattamento al seno da far conoscere a tutto il personale sanitario
 - d. Mettere i neonati in contatto pelle a pelle con la madre immediatamente dopo la nascita per almeno un'ora e incoraggiare le madri a comprendere quando il neonato è pronto per poppare, offrendo aiuto se necessario
- 2) La tricotomia pre- operatoria (indicare la risposta corretta)
- a. deve essere effettuata di routine
 - b. deve essere effettuata con crema depilatoria EMLA
 - c. non previene le infezioni del sito chirurgico
 - d. non deve essere mai effettuata
- 3) Qual è il sintomo caratteristico di un bambino con stenosi ipertrofica del piloro
- a. rifiuto di alimentarsi dopo l'episodio di vomito
 - b. diarrea
 - c. vomito a getto
 - d. vomito biliare
- 4) Quali di questi farmaci è somministrabile per via intracardiaca?
- a. metronidazolo
 - b. paracetamolo
 - c. ampicillina
 - d. adrenalina
- 5) Quali delle seguenti Ig sono in grado di attraversare la placenta?
- a. IgG
 - b. IgM
 - c. IgE
 - d. IgA
- 6) L'antidoto utilizzato per neutralizzare la somministrazione eccessiva di anticoagulanti è:
- a. vitamina k
 - b. blu di metilene
 - c. naloxone
 - d. L' N-acetilcisteina





- 7) Qual è l'agente eziologico più comune nella bronchiolite:
- Parvovirus B19
 - Epstein-Barr
 - Virus Respiratorio Sinciziale
 - Escherichia-Coli
- 8) Quali dispositivi sono disponibili per la ventilazione manuale del neonato?
- Tutte le risposte sono corrette
 - Pallone flusso-dipendente o da anestesia (VA E VIENI)
 - Pallone auto-insufflante (AMBU)
 - Neo-puff
- 9) Il neonato definito con il termine "AGA"
- Ha un peso che rapportato all'età gestazionale è superiore al 90° percentile
 - Ha un peso che rapportato all'età gestazionale è inferiore al 90° percentile
 - Ha un peso che rapportato all'età gestazionale è compreso tra il 10° percentile e 90° percentile
 - Ha un peso che rapportato all'età gestazionale è compreso tra il 25° e 50° percentile
- 10) Cosa si intende per "minimal enteral feeding" in un neonato pretermine ?
- Somministrazione di una piccola quantità di latte con lo scopo di aumentare l'attività motoria e secretiva intestinale
 - Somministrazione di latte in un arco di tempo breve (20-30 minuti)
 - Somministrazione di lipidi concentrati
 - Somministrazione di una piccola quantità di latte in polvere 1- 2 volte al giorno
- 11) Quale delle seguenti scale di misurazione del dolore utilizzate in età pediatrica è anche detta "delle facce"
- scala FLACC
 - scala PIPP
 - scala Wong-Baker
 - scala EDIN
- 12) Quale delle seguenti posture è la più indicata in un neonato che presenta distress respiratorio?
- supina



- b. decubito laterale destro
- c. semi seduta
- d. prona

13) In cosa consistono le diagnosi infermieristiche?

- a. Identificazione dei problemi di salute curabili mediante interventi infermieristici
- b. Diagnosi da associare alla scheda di dimissione ospedaliera
- c. Diagnosi e cura in autonomia di tutte le malattie
- d. Diagnosi non di competenza infermieristica

14) Quale delle seguenti affermazioni relativamente alla tracheostomia NON è corretta

- a. la pressione negativa di aspirazione deve essere sempre maggiore di 250cmH₂O
- b. è consigliata l'igiene delle mani prima di effettuare la medicazione
- c. tenere vicino al paziente una cannula di riserva per sostituirla in caso di occlusione
- d. utilizzare un apposito collarino di fissaggio per assicurare la tenuta della cannula in modo corretto

15) Quale delle seguenti risposte indica una condizione di ipernatriemia nel bambino?

- a. 125 mmol/l
- b. 185 mmol/l
- c. 50 mmol/l
- d. 100 mmol/l

16) Quale affermazione è corretta quando si parla di "rianimatore con raccordo a "T":

- a. viene utilizzato per la ventilazione in alta frequenza oscillatoria
- b. dirige il gas compresso al neonato quando l'apertura sull'estremità del raccordo a "T" viene chiusa
- c. viene utilizzato sempre senza maschera ventilatoria
- d. non può mai essere utilizzato per la ventilazione del neonato

17) Cosa si intende per "lavaggio antisettico" delle mani

- a. frizionamento delle mani con soluzione idroalcolica
- b. utilizzato dall'equipe chirurgica e praticato con sostanze disinfettanti
- c. mira a eliminare la sporcizia e la flora transitorie o contaminante con l'impiego di acqua e sapone liquido





d. ha lo scopo di eliminare la flora microbica delle mani grazie all'uso di soluzione come iodopovidone o clorexidina in soluzione saponosa

18) Quale delle seguenti affermazioni sul catetere venoso periferico NON è corretta?

- a. sono dispositivi endovenosi più comunemente usati per scopi terapeutici come la somministrazione di farmaci e fluidi
- b. è necessario controllare il sito di inserzione per valutare eventuali segni di infezioni/infiltrazioni
- c. la sostituzione di routine non è più consigliata dalle linee guida, pertanto viene sostituito quando parzialmente rimosso, quando presenta segni di flebite, infiltrazione e stravasato
- d. l'estremità del catetere raggiunge la giunzione cavo atriale

19) Una fiala di midazolam contiene 20 mg in 4 ml, se la dose prescritta è di 2 mg quanti ml devo aspirare?

- a. 2 ml
- b. 0,4 ml
- c. 0,8ml
- d. 0,12 ml

20) Quale delle seguenti affermazioni sulla somministrazione endovenosa di potassio NON è corretta

- a. lo stravasato di potassio può causare un danno tissutale
- b. il potassio deve essere possibilmente conservato in un armadio chiuso a chiave in contenitori su cui sia appostata la segnalazione diluire correttamente mortale se non diluito
- c. la preparazione del potassio non richiede il doppio controllo
- d. può causare effetti letali se somministrato in modo inappropriato

21) Relativamente al sondino naso gastrico indica la risposta corretta

- a. viene utilizzato per effettuare la nutrizione enterale nel neonato prematuro non ancora autonomo dal punto di vista della suzione, nell'attesa dell'acquisizione delle competenze neuro motorie
- b. viene posizionato nella maggior parte dei casi dal neonatologo
- c. non può essere mai utilizzato per la somministrazione di farmaci
- d. viene utilizzato per effettuare la nutrizione parenterale nel neonato prematuro





- 22) Per quanto riguarda il supporto al contatto pelle a pelle (SSC o marsupioterapia) nel neonato pretermine, gli Standard Organizzativi per l'assistenza perinatale suggeriscono
- di proporlo solamente nel neonato con peso maggiore di 2 Kg
 - di proporlo raramente in quanto comporta un'alterazione dei parametri vitali
 - di aiutare i genitori a comprendere l'importanza del SSC non come obbligo ma come opportunità, rispettando le singole scelte
 - di interromperlo per l'esecuzione di attività dolorose
- 23) Cosa s'intende con l'acronimo "ECMO"
- Extra Cardiac Membrane Oxygenation
 - Extra Corporeal Membrane Oxygenation
 - Extra Corporeal Minimal Oxygenation
 - Extra Corporeal Maximal Orientation
- 24) Il triage è un sistema di valutazione rapida degli assistiti che accedono in pronto soccorso, il codice bianco viene attribuito a:
- soggetto acuto
 - soggetto urgente
 - soggetto critico (immediato pericolo di vita)
 - soggetto non urgente
- 25) Quali sono i principali segni presenti già alla nascita in un neonato affetto da atresia esofagea?
- Tutte le risposte sono corrette
 - Impossibile posizionare un sondino nasogastrico
 - Addome iperesteso in caso di fistola
 - Tosse e cianosi ad ogni tentativo di alimentazione
- 26) Dovendo somministrare i 4/5 di una fiala da 1gr di Ampicillina, quanti mg si somministrano?
- 600 mg
 - 100 mg
 - 800 mg
 - 250 mg





27) Nel BLS-D Pediatrico cosa prevede la fase "C"

- a. valutazione della circolazione che comprende la valutazione dei segni vitali e del polso centrale
- b. valutazione della respirazione mediante il guardo, ascolto e sento (GAS)
- c. Girare verso destra o sinistra la testa del bambino
- d. Posizionare il bambino prono

28) In un neonato che presenta alla nascita un punteggio "APGAR" compreso tra 7 e 10 è considerato:

- a. neonato moderatamente depresso
- b. neonato gravemente depresso
- c. neonato normale
- d. neonato che necessita di rianimazione neonatale

29) Quale delle seguenti affermazioni sulla somministrazione di farmaci per via intraossea NON è corretta?

- a. una delle sedi è la tibia prossimale
- b. viene effettuata di routine in pediatria
- c. è utilizzata in condizioni di emergenza
- d. può essere utilizzata per infondere farmaci, cristalloidi e derivati del sangue

30) Su quanti item è strutturata la scala del dolore "CHEOPS"

- a. 1
- b. 4
- c. 6
- d. 8






TRACCE PROVE PRATICHE

PROVA PRATICA N. 1

- 1) Per preparare 1 biberon di latte formulato (in polvere) da 50 ml, con una concentrazione del 13%, quanti grammi di polvere di latte deve contenere il biberon?
- a) 6,5 g
b) 13 g
c) 7,5 g
d) 26 g
- 2) Lucia è una neonata di 3Kg, facendo riferimento alla tabella sottostante, che indica la diuresi del giorno 21/12, calcolare la diuresi giornaliera in ml/kg/h.

21 dicembre	
Ore 05	90 ml
Ore 11	54 ml
Ore 15	60 ml
Ore 19	94 ml
Ore 23	62 ml

- a) 70 ml/kg/h
b) 100ml/kg/h
c) 30 ml/kg/h
d) 5 ml/kg/h
- 3) Quale procedura è rappresenta nell'immagine sottostante?



- a) Posizionamento di un catetere vescicale
- b) Posizionamento di un sacchetto per la raccolta delle urine
- c) Posizionamento di un sacchetto per la raccolta urine dall'ureterostomia
- d) Posizionamento di un sacchetto di polietilene per accertamenti particolari

4) A quale presidio si fa riferimento nell'immagine



- a) circuito ventilatorio
- b) valvola unidirezionale di Heimlich
- c) sistema di aspirazione a circuito chiuso
- d) sistema per la somministrazione di terapia inalatoria

5) A Luca è stato prescritto il Lasix (furosemide) sciroppo 30mg. La sospensione contiene 10 mg/1ml. Quanti ml devo somministrare?



- a) 32 ml
- b) 3 ml
- c) 0,32 ml
- d) 6,4 ml

6) Il latte materno rappresenta il miglior alimento per il neonato perché fornisce tutti i nutrienti necessari nella prima fase della vita ed è un alimento specie-specifico. Qui è rappresentata una delle posizioni per allattare, di quale posizione si tratta?



- a) posizione transizionale
- b) posizione delle lupa
- c) posizione a rugby
- d) posizione sdraiata

7) Elencare il materiale necessario per il posizionamento di un catetere venoso periferico

- a) anestetico locale, batuffoli imbevuti di antisettico, catetere venoso periferico di dimensioni appropriate, medicazione sterile (semipermeabile e trasparente), prolunga con raccordo luer-lock, tappo luer-lock, camice sterile, laccio emostatico, siringa con soluzione fisiologica
- b) anestetico locale, batuffoli imbevuti di antisettico, catetere venoso periferico di dimensioni appropriate, medicazione sterile (semipermeabile e trasparente), prolunga con raccordo luer-lock, tappo luer-lock, cuffia, guanti sterili, laccio emostatico, siringa con soluzione fisiologica
- c) anestetico locale, batuffoli imbevuti di antisettico, catetere venoso periferico di dimensioni appropriate, medicazione sterile (semipermeabile e trasparente), prolunga con raccordo luer-lock, pinza chirurgica, cuffia, guanti sterili, laccio emostatico, siringa con soluzione fisiologica
- d) anestetico locale, batuffoli imbevuti di antisettico, catetere venoso periferico di dimensioni appropriate, medicazione sterile (semipermeabile e trasparente), prolunga con raccordo



luer-lock, tappo luer-lock, guanti non sterili, laccio emostatico, siringa con soluzione fisiologica

8) A quale presidio si fa riferimento nell'immagine sottostante



- a) cannula di guedel
- b) cannula nasale
- c) cannula naso faringea
- d) cannula tracheostomica

9) Vieni chiamato i "isola neonatale" per la nascita di un neonato di 25 settimane, quali tra i seguenti accorgimenti NON è indispensabile per la corretta gestione di un neonato così prematuro?

- a) controllare il corretto funzionamento dell'aspiratore e del materiale predisposto alla ventilazione
- b) preparare sacchetto di polietilene per evitare la dispersione di calore
- c) preparare il materiale necessario per l'esecuzione di una rachicentesi in urgenza
- d) preparare il materiale necessario per il monitoraggio dei parametri vitali

10) Quale tra i seguenti non è segno di una suzione efficiente ?

- a) Guance piene e arrotondate, non infossate
- b) Il bambino mangia con calma
- c) Il bambino finisce la poppata da solo e sembra soddisfatto
- d) La madre avverte dolore.



PROVA PRATICA N. 2

1) Per preparare 1 biberon di latte formulato (in polvere) da 80 ml, con una concentrazione del 15%, quanti grammi di polvere di latte deve contenere il biberon?

- a) 40 g
- b) 5 g
- c) 12g
- e) 25 g

2) Paolo è un neonato di 2Kg, facendo riferimento alla tabella sottostante che indica la diuresi del giorno 18/12, calcolare la diuresi giornaliera in ml/kg/h.

21 dicembre	
Ore 05	20ml
Ore 11	30ml
Ore 15	10ml
Ore 19	20ml
Ore 23	40ml

- a) 40 ml/kg/h
- b) 2,5 ml/kg/h
- c) 0,5 ml/kg/h
- d) 10 ml/kg/h

3) A quale procedura si fa riferimento nell'immagine?





- a) Rachicentesi
- b) Posizionamento di un drenaggio toracico dx
- c) Posizionamento di un catetere venoso ombelicale
- d) Posizionamento di un drenaggio addominale

4) A quale presidio si fa riferimento nell'immagine?



- a) maschera laringea
- b) cannula di guedel
- c) raccordo per tubo endotracheale
- d) cannula tracheostomica



- 5) Il latte materno rappresenta il miglior alimento per il neonato perché fornisce tutti i nutrienti necessari nella prima fase della vita ed è un alimento specie-specifico. Qui è rappresentata una delle posizioni per allattare, di quale posizione si tratta?



- a) posizione a culla
b) posizione incrociata
c) posizione semireclinata
d) posizione a rugby
- 6) A Benedetta viene prescritta la gentamicina 40 mg per via endovenosa al giorno.
La preparazione si presenta in fiale da 80mg/2ml, quanti ml devono essere somministrati?
- a) 2 ml
b) 0,1 ml
c) 0,8 ml
d) 1 ml
- 7) Indicare il materiale necessario per l'esecuzione di un prelievo capillare in un neonato
- a) contenitore per lo smaltimento dei taglienti e il materiale a rischio biologico, etichetta identificativa, ago cannula 24G, guanti non sterili, disinfettante e garze, capillare, tappini per chiudere il capillare

- b) contenitore per lo smaltimento dei taglienti e il materiale a rischio biologico, etichetta identificativa, cerotto, guanti non sterili, disinfettante e garze, lancetta pungidito della dimensione adeguata, capillare, tappini per chiudere il capillare
- c) contenitore per lo smaltimento dei taglienti e il materiale a rischio biologico, etichetta identificativa, cerotto, guanti non sterili, disinfettante e garze, provetta con EDTA, butterfly 23G
- d) contenitore per lo smaltimento dei taglienti e il materiale a rischio biologico, etichetta identificativa, medicazione compressiva, guanti sterili, garze sterili, disinfettante , lancetta pungidito della dimensione adeguata, provette necessarie

8) A quale presidio si fa riferimento nell'immagine?



- a) maschera per aerosol
- b) maschera con rebreather parziale
- c) maschera di venturi
- d) maschera facciale semplice

9) Quali possono essere i segni di un pneumotorace iperteso in un neonato?

- a) distress respiratorio, cianosi, simmetria del torace, alterazione dei parametri vitali
- b) distress respiratorio, cianosi, asimmetria del torace, alterazione dei parametri vitali
- c) distress respiratorio, colorito roseo, asimmetria del torace, alterazione dei parametri vitali
- d) distress respiratorio, cianosi, asimmetria del torace, stabilità dei parametri vitali



- 10) Quale è la corretta informazione da dare ad una mamma alla sua prima esperienza di allattamento?
- a) Sostenere il bambino: non è importante che la testa e il corpo del bambino siano in asse.
 - b) Sostenere il bambino: Il viso del piccolo dovrebbe trovarsi rivolto verso il seno con il naso di fronte al capezzolo.
 - c) Sostenere il bambino: non è necessario che tenga il corpo del bambino a contatto con il suo.
 - d) Sostenere solamente la testa e le spalle del bambino.

PROVA PRATICA N. 3

- 1) Per preparare 1 biberon di latte formulato (in polvere) da 50 ml, con una concentrazione del 18%, quanti grammi di polvere di latte deve contenere il biberon?
- a) 90 g
 - b) 20 g
 - c) 9 g
 - d) 2,6 g
- 2) Silvia è una neonata di 4Kg, facendo riferimento alla tabella sottostante che indica la diuresi del giorno 09/10, calcolare la diuresi giornaliera in ml/kg/h.

9 ottobre	
Ore 05	20ml
Ore 11	15ml
Ore 15	10ml
Ore 19	20ml
Ore 23	31ml

- a) 1ml/kg/h
- b) 5ml/kg/h
- c) 30 ml/kg/h
- d) 0,5ml/kg/h



3) Quale procedura è rappresentata nell'immagine sottostante?



- a) Prelievo ematico capillare
- b) Prelievo ematico da catetere venoso centrale
- c) Posizionamento accesso venoso periferico
- d) Posizionamento catetere Hickman

4) La foto sotto riportata a quale test fa riferimento?

The form contains the following sections and fields:

- Qualità del prelievo:** SI (with a red dot icon) or NO (with a red dot icon crossed out).
- Identificazione:** Codice fiscale, Cognome Neonato, Nome Neonato, Gemello (checkbox).
- Trasferito da altro Ospedale:** SI / NO (checkbox).
- Sesso:** M (Maschio) / F (Femmina) (checkbox).
- Peso e Altezza:** Peso (kg), E.C. (cm).
- Data:** Data Nascita, Data Prelievo, Ora (hh:mm).
- Parto:** Naturale / T.C. (Cesareo) / Altro (checkbox).
- Alimentazione:** Neo non alimentato / Neo in alimentazione con HU (Latte materno) / ART (Latte artificiale) / EN (Entero nutrizione) / TPN (Nutrizione parenterale totale) / TPN+MCT (Materie cataboliche) / TPN+Cam (Cammino).
- Dieta Madre:** Libera / Vegetariana / Vegana (checkbox).
- Testi:** Pat. meconiale neonatale, Pat. tiroidea materna, T. antibiotica materna, T. antibiotica neonatale, T. cortisonica materna, T. cortisonica neonatale.
- Trasfusione:** SI / NO (checkbox).
- Diagnostica:** Geo (Emo, M.Or, Alt, As, N.Am, S.Am), Disarmo Analisi Genetiche (checkbox).
- Informazioni personali:** Cognome, Nome, Indirizzo, Comune, CAP, Tel.
- Barcode:** SN 22LD159012.
- Vertical text on the right:** RIMUOVERE PRIMA DELLA SPEDIZIONE.



- a) test di Coombs
 - b) test di Guthrie
 - c) test di Allen
 - d) test di George
- 5) A Francesco sono stati prescritti 300mg di Oraxim (cefuroxima) sciroppo. La sospensione contiene 250mg/ 5ml, quanti ml devo somministrare?
- a) 3 ml
 - b) 6 ml
 - c) 5,5 ml
 - d) 12 ml
- 6) Il latte materno rappresenta il miglior alimento per il neonato perché fornisce tutti i nutrienti necessari nella prima fase della vita ed è un alimento specie-specifico. Qui è rappresentata una delle posizioni per allattare, di quale posizione si tratta?




- a) posizione a culla
- b) posizione incrociata
- c) posizione semireclinata
- d) posizione a rugby



7) Indicare il materiale necessario per il posizionamento di un catetere arterioso

- a) catetere arterioso di adeguata dimensione, clorexidina, lidocaina se necessaria, soluzione fisiologica, siringhe, telo sterile, rubinetto a tre vie, garze, guanti, DPI, medicazione sterile semipermeabile trasparente, pinza di Magill
- b) catetere venoso centrale di adeguata dimensione, clorexidina, lidocaina se necessaria, soluzione fisiologica, rubinetto a tre vie, garze sterili, guanti sterili, DPI, medicazione sterile semipermeabile trasparente, pinza chirurgica
- c) catetere arterioso di adeguata dimensione, clorexidina, lidocaina se necessaria, soluzione fisiologica, siringhe, telo sterile, rubinetto a tre vie, garze, guanti, DPI, medicazione non sterile semipermeabile trasparente, pinza chirurgica, sacchetto urine, siringa per emogasanalisi
- d) catetere arterioso di adeguata dimensione, clorexidina, lidocaina se necessaria, soluzione fisiologica, siringhe, telo sterile, rubinetto a tre vie, garze sterili, guanti sterili, DPI, medicazione sterile semipermeabile trasparente, pinza chirurgica

8) A quale presidio si fa riferimento nell'immagine





- a) maschera di venturi
 - b) cannula nasale
 - c) cannula tracheostomica
 - d) cannula di guedel
- 9) Un neonato giunge in patologia neonatale dal nido per ipoglicemia, quali delle seguenti manifestazioni cliniche potrebbe presentare?
- a) Fontanella bombata, edema periorbitale
 - b) Vomito biliare, addome teso e poco trattabile
 - c) Tremori, letargia, ipotonia
 - d) Rush cutaneo e petecchie
- 10) Quale, tra i seguenti , è segno di suzione non efficiente?
- a) bambino agitato che si stacca e riattacca in continuazione
 - b) bambino che mangia con calma
 - c) la madre non avverte dolore
 - d) guance piene e arrotondate

TRACCE PROVA ORALE

- QUESITO N. 1:** Drenaggio toracico: definizione, indicazioni, controindicazioni e complicanze
- QUESITO N. 2:** Gestione Del Paziente Con Nutrizione Parenterale
- QUESITO N. 3:** Assistenza infermieristica pre e post operatoria
- QUESITO N. 4:** Cosa intende per enteroclisma: materiali e modalita' di esecuzione
- QUESITO N. 5:** Definizione di ventilazione non invasiva ad alti flussi
- QUESITO N. 6:** Assistenza infermieristica ad un paziente affetto da atresia esofagea
- QUESITO N. 7:** Cosa s'intende per PBLs
- QUESITO N. 8:** Quali sono le tecniche per eseguire un urinocoltura
- QUESITO N. 9:** Gestione della gastrostomia (PEG)
- QUESITO N. 10:** Quali sono i principali interventi da mettere in atto per stabilizzare posturalmente un neonato prematuro
- QUESITO N. 11:** Definizione di ittero neonatale e quali interventi assistenziali l'infermiere pediatrico mette in atto in un neonato in fototerapia



- QUESITO N. 12:** Raccolta di un campione di sangue per emocoltura: indicazioni e metodi
- QUESITO N. 13:** Indicare le precauzioni da mettere in atto al fine di prevenire lo stravasamento venoso
- QUESITO N. 14:** In tema di processo terapeutico quali sono le regole da rispettare
- QUESITO N. 15:** Puntura lombare: quando e' raccomandate e modalita' di esecuzione
- QUESITO N. 16:** Quali sono le tecniche per eseguire un'emogasanalisi
- QUESITO N. 17:** Raccomandazioni per la preparazione e somministrazione di kcl
- QUESITO N. 18:** Cosa s'intende per misurazione pulsossimetria percutanea
- QUESITO N. 19:** Intubazione entotracheale: materiali e modalita'
- QUESITO N. 20:** Assistenza infermieristica al neonato ipoglicemico
- QUESITO N. 21:** Posizionamento di un accesso venoso periferico: materiali e modalita'.
Che cos'è la kangaroo mother care- quando si può iniziare e per quali aspetti è importante?
- QUESITO N. 23:** Segni e sintomi dell'insufficienza respiratoria in un neonato.
- QUESITO N. 24:** Assistenza infermieristica al neonato in ncpap
- QUESITO N. 25:** Principali scale di valutazione del dolore in un neonato.
- QUESITO N. 26:** quali sono i principali interventi di prevenzione delle infezioni catetere correlate?
- QUESITO N. 27:** definizione di anuria, oliguria, poliuria.
- QUESITO N. 28:** Posizionamento di un catetere venoso centrale percutaneo: materiali e modalita'

