



CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO DI N. 5 POSTI DI INFERMIERE (AREA DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE E DEI FUNZIONARI-RUOLO SANITARIO) A TEMPO PIENO.

Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 come modificato dall'art. 18 del D.Lgs 25 maggio 2016 n. 97 si pubblicano:

- I criteri di valutazione della Commissione in merito alla prova scritta, alla prova pratica, alla prova orale e alla valutazione dei titoli;
- Le tracce delle prove scritta, pratica ed orale.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA

Per la valutazione della prova scritta la Commissione ha attribuito ai singoli quesiti della prova scritta i seguenti punteggi:

- + 1 punto per ogni risposta esatta;
- 0 punti per risposte errate, omesse o multiple.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA PRATICA

Per la valutazione della prova pratica la Commissione ha attribuito ai singoli quesiti della prova pratica i seguenti punteggi:

- + 2 punti per ogni risposta esatta;
- 0 punti per risposte errate, omesse o multiple.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE

La valutazione della prova orale è stata operata in relazione al livello di conoscenza ed analisi dell'argomento trattato dimostrato dai candidati.

CRITERI VALUTAZIONE TITOLI

Come indicato nella sottostante tabella.





Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 5 posti di Infermiere (Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari - Ruolo Sanitario) a tempo pieno

CARRIERA (max 15,000 punti)

arrotonda periodi superiori ai 15 gg a 1 mese

Cod.	Regola	Punti	x mesi	Tipo calcolo	Unità mis.	Omog.	Sovr.	% val.
100	Presso USL/PA nel profilo	1,200	12	PRC	mesi	Si	Si	100
101	Presso USL/PA nel profilo cat. superiore	1,200	12	PRC	mesi	Si	Si	100
102	Presso USL/PA nel profilo cat. inferiore	0,600	12	PRC	mesi	Si	Si	100
170	Servizio militare/civile funzioni inerenti	1,200	12	PRC	mesi	Si	Si	100
180	Presso case di cura convenzionate o accreditate nel profilo	1,200	12	PRC	mesi	Si	Si	25
181	Presso case di cura convenzionate o accreditate nel profilo cat. inferiore	0,600	12	PRC	mesi	Si	Si	25
199	Servizio non valutabile	0,000	12	PRC	mesi	Si	Si	100

ACCADEMICI E DI STUDIO (max 5,000 punti)

arrotonda periodi superiori ai 0 gg a 0 mesi

Cod.	Regola	Punti	x mesi	Tipo calcolo	Unità mis.	Omog.	Sovr.	% val.
200	Laurea Magistrale Scienze Infermieristiche	2,000	0	N	n.	No	No	100
201	Dottorato di ricerca attinente	2,000	0	N	n.	No	No	100
202	Dottorato di ricerca NON attinente	1,000	0	N	n.	No	No	100
203	Master di I liv. attinenti al profilo/Certificato Abilitazione Funzioni Direttive	1,000	0	N	n.	No	No	100
204	Laurea Triennale/Master NON attinenti al profilo	0,250	0	N	n.	No	No	100
205	Diploma di Laurea vecchio Ord./Laurea Spec. o Magistrale NON attinenti al profilo	0,500	0	N	n.	No	No	100
206	Master di II livello attinenti al profilo	1,500	0	N	n.	No	No	100
207	Altra Laurea Triennale attinente oltre a quella prevista quale requisito di ammissione	1,000	0	N	n.	No	No	100
208	Diploma di laurea vecchio ordinamento/Laurea specialistica o magistrale attinente al profilo	1,000	0	N	n.	No	No	100
210	Diploma di specializzazione universitaria attinente	2,000	0	N	n.	No	No	100
215	Diploma di specializzazione universitaria NON attinente	1,000	0	N	n.	No	No	100
299	Titoli di studio ed accademici non valutabili	0,000	0	N	n.	No	No	100

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI (max 5,000 punti)

arrotonda periodi superiori ai 0 gg a 0 mesi

Cod.	Regola	Punti	x mesi	Tipo calcolo	Unità mis.	Omog.	Sovr.	% val.
301	Pubblicazioni su riviste con impact-factor	1,000	0	N	n.	No	No	100
302	Pubblicazioni su riviste indicizzate	0,500	0	N	n.	No	No	100
350	Abstract, poster comunicazioni a congressi, capitoli di libro	0,100	0	EVE	n.	No	No	100
360	Pubblicazioni su riviste NON indicizzate	0,100	0	N	n.	No	No	100
370	Lavori NON attinenti	0,000	0	N	n.	No	No	100
399	Lavori non valutabili	0,000	0	N	n.	No	No	100



Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 5 posti di Infermiere (Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari - Ruolo Sanitario) a tempo pieno

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE (max 5,000 punti)

arrotonda periodi superiori ai 15 gg a 1 mese

Cod.	Regola	Punti	x mesi	Tipo calcolo	Unità mis.	Omog.	Sovr.	% val.
400	Servizi prestati nel profilo a qualsiasi titolo non valutati in carriera presso Strutture Sanitarie Pubbliche o Convenzionate o IRCCS Privati	0,300	12	PRC	mesi	Si	No	100
401	Servizi prestati nel profilo a qualsiasi titolo non valutati in carriera presso Privati e strutture estere	0,150	12	PRC	mesi	Si	No	100
405	frequenza volontaria/Stage/Tirocinio quale infermiere	0,000	12	PRC	mesi	Si	No	100
409	Altri Servizi prestati NON nel profilo a qualsiasi titolo	0,000	12	PRC	mesi	Si	Si	100
450	Corsi di Formazione, Agg.to Prof.le, Convegni ecc. (Partecipante/Tutor)	0,001	0	N	n.	No	No	100
451	Corsi di Formazione, Agg.to Prof.le, Convegni ecc. (Relatore/Responsabile Scientifico/Docente)	0,050	0	N	n.	No	No	100
452	PBLS - BLS conseguito negli ultimi due anni	0,030	0	N	n.	No	No	100
453	PBLS D - BLS D conseguito negli ultimi due anni	0,050	0	N	n.	No	No	100
455	Altre Certificazioni di competenza Prof.le secondo standard Internazionali	0,050	0	N	n.	No	No	100
456	PTC ALS PALS ILS, ect	0,010	0	N	n.	No	No	100
457	Corsi di Perfezionamento a livello Universitario attinenti al profilo	0,030	0	N	n.	No	No	100
470	Membro Società Scientifiche	0,000	0	N	n.	No	No	100
480	Attività didattica attinente	0,100	12	PRC	mesi	Si	No	100
485	Titoli per i quali la Commissione ritiene di non attribuire alcun punteggio	0,000	0	N	n.	No	No	100
490	Titoli vari NON attinenti	0,000	0	N	n.	No	No	100
499	Titoli non valutabili	0,000	0	N	n.	No	No	100
800	=====	0,000	0	N	n.	No	No	100



TRACCE PROVE SCRITTE

Come di seguito riportate:





Fondazione IRCCS Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

IRCCS CA' GRANDA

**concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
a tempo indeterminato e a tempo pieno din. 5 posti di
Collaboratore Professionale Sanitario –
Infermiere Cat. D**

PROVA SCRITTA 01

A00001

1 La produzione di urina inferiore a 100 ml in 24 ore è definita:

- ☐ A anuria
- ☐ B enuresi
- ☐ C poliuria
- ☐ D disuria

A00002

2 Si definisce "tachicardia":

- ☐ A la presenza di un polso arterioso con frequenza superiore a 100 battiti/minuto
- ☐ B la presenza di un polso arterioso con frequenza inferiore a 80 battiti/minuto
- ☐ C la presenza di un polso arterioso aritmico
- ☐ D la presenza di una frequenza respiratoria superiore a 20 atti/minuto

A00003

3 Tutte le scale di valutazione seguenti possono essere utilizzate per valutare il rischio di lesioni da pressione tranne una. Indicare quale:

- ☐ A Conley
- ☐ B Braden
- ☐ C Norton
- ☐ D Waterloo

A00004

4 Il Decreto Ministeriale 739/1994:

- ☐ A identifica il Profilo Professionale dell'Infermiere
- ☐ B ratifica la promulgazione del primo Codice Deontologico dell'Infermiere
- ☐ C introduce il Sistema di Educazione Continua in Medicina (ECM)
- ☐ D tutte le altre alternative sono corrette

A00005

5 Indicare il significato del termine "alopecia":

- ☐ A mancanza totale o parziale dei capelli e dei peli
- ☐ B assenza di mestruazioni
- ☐ C insufficienza del normale processo di generazione cellulare
- ☐ D incapacità del muscolo di rilassarsi

A00006


6 Un assistito presenta valori di glicemia a digiuno pari a 40 mg/dl. La condizione riportata si definisce:

- ☐ A ipoglicemia
- ☐ B iperglicemia
- ☐ C afagia
- ☐ D normoglicemia

-
- 13 A00013
Quale fra le seguenti scale di valutazione del dolore è la più indicata per i soggetti intubati e sedati in terapia intensiva?
A BPS
B Wong-Baker
C NRS
D PAINAD
-
- 14 A00014
Un assistito ha gruppo sanguigno 0 e deve essere sottoposto a trasfusione. Potrà ricevere sangue:
A solo da donatori di gruppo 0
B da donatori di qualsiasi gruppo
C da donatori di gruppo AB o 0 ma non dai donatori di gruppo A o B
D da donatori di gruppo A, B o 0 ma non dai donatori di gruppo AB
-
- 15 A00015
Quale tra le seguenti molecole è un farmaco antiaggregante:
A Acido Acetilsalicilico
B Bisoprololo
C Rosuvastatina
D Levetiracetam
-
- 16 A00016
La fibrosi cistica è:
A una malattia genetica rara
B una patologia neurodegenerativa
C una malattia infettiva contagiosa
D una malattia cronica prevenibile
-
- 17 A00017
Generalmente, la malattia di Alzheimer si manifesta con:
A deficit di memoria a breve termine
B disturbi motori, rigidità, e tremori
C emiplegia e disturbi del linguaggio
D ipotensione e disturbi vasomotori
-
- 18 A00018
Quale fra questi prodotti disinfettanti è indicato come un cancerogeno certo dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità?
A Formaldeide
B Alcol
C Cloro
D Iodio
-

-
- 19 A00019
- La pratica del rooming-in:**
- A** consiste nel posizionare il neonato nella stessa stanza di degenza della madre
 - B** è la pratica che prevede il contatto pelle a pelle fra mamma e neonato
 - C** è la pratica che prevede l'esecuzione del bagnetto entro le prime 24 ore
 - D** consiste nell'esporre il neonato a una luce blu o bianca per ridurre il livello di bilirubina
-
- 20 A00020
- Indicare l'affermazione corretta rispetto all'indice di Apgar:**
- A** prevede l'osservazione di segni clinici quali frequenza cardiaca, respirazione, tono muscolare, eccitabilità e colorito cutaneo
 - B** con un punteggio pari a 9 il neonato è considerato gravemente depresso e necessita di rianimazione primaria immediata
 - C** deve essere valutato solo a 30 e 60 minuti dalla nascita
 - D** viene valutato esclusivamente sui neonati fisiologici, ma non su neonati patologici
-
- 21 A00021
- Anatomicamente, l'appendice è localizzata:**
- A** in fossa iliaca destra
 - B** in ipogastrio
 - C** in ipocondrio destro
 - D** in mediastino
-
- 22 A00022
- Una persona assistita, a seguito di un ictus cerebri, non è più in grado di mobilitare l'emisoma destro. Come potrà essere definita la sua condizione?**
- A** Emiplegia
 - B** Paraplegia
 - C** Monoplegia
 - D** Tetraplegia
-
- 23 A00023
- La vitamina D:**
- A** regola il deposito e il riassorbimento di calcio nelle ossa
 - B** permette la sintesi dei fattori della coagulazione
 - C** favorisce la produzione di emoglobina e il metabolismo cellulare
 - D** permette la visione notturna e dei colori
-
- 24 A00024
- I valori ematici di Potassio (K+) sono pari a:**
- A** 3,5-5 mEq/L
 - B** 5,5-25 mEq/L
 - C** 70-110 mg/dL
 - D** 135-145 mmol/L
-

-
- 25 **Il *Toxoplasma gondii*:** A00025
- A** è un protozoo parassita
 - B** è un virus a RNA
 - C** è un retrovirus
 - D** è un batterio
-
- 26 **La posizione supina:** A00026
- A** è la posizione distesa sul dorso
 - B** indica la posizione seduta, con la testa elevata di 80°-90° rispetto al piano del letto
 - C** indica la posizione in cui l'assistito giace sull'addome con la testa girata da un lato
 - D** è la posizione distesa sul fianco con le gambe dritte
-
- 27 **I globuli bianchi:** A00027
- A** sono componenti importanti del sistema immunitario
 - B** intervengono nella risposta coagulatoria che sigilla la discontinuità nel rivestimento endoteliale
 - C** sono responsabili del trasporto di ossigeno nel sangue
 - D** rappresentano la matrice acquosa del sangue
-
- 28 **Il sintomo principale dell'infarto miocardico è:** A00028
- A** dolore toracico
 - B** emiparesi destra
 - C** difficoltà nell'eloquio
 - D** oliguria
-
- 29 **La concentrazione normale di piastrine nel sangue:** A00029
- A** è compresa fra 200mila e 400mila unità per mm^3
 - B** è di 10-15 mEq/L
 - C** è di 12-15 g/dl nella donna e 13,5-18 g/dl nell'uomo
 - D** è compresa fra 5000 e 10.000 unità per mm^3
-
- 30 **PubMed è:** A00030
- A** la principale banca dati bibliografica biomedica
 - B** una tecnica ecografica usata in ambito uro-ginecologico
 - C** il portale istituzionale del Ministero della Salute
 - D** il nome del Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie Infettive europeo
-





Fondazione IRCCS Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

IRCCS CA' GRANDA

**concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
a tempo indeterminato e a tempo pieno din. 5 posti di
Collaboratore Professionale Sanitario –
Infermiere Cat. D**

PROVA SCRITTA 02

-
- 1 B00001
- Si definisce stranguria:**
- A** l'emissione difficoltosa, lenta e dolorosa di piccole quantità di urina
 - B** la produzione di urina superiore ai 1500-2000 ml/die
 - C** la perdita involontaria di urina durante il sonno
 - D** la presenza di materiale purulento nelle urine
-
- 2 B00002
- Si definisce "ipotensione":**
- A** la presenza di valori di pressione arteriosa sistolica ≤ 90 mmHg o di pressione arteriosa diastolica ≤ 60 mmHg
 - B** la presenza di un polso arterioso con frequenza superiore a 100 battiti/minuto
 - C** la presenza di valori di pressione arteriosa sistolica ≥ 130 mmHg o di pressione arteriosa diastolica ≥ 90 mmHg
 - D** la presenza di una frequenza respiratoria inferiore a 12 atti/minuto
-
- 3 B00003
- Tutte le scale di valutazioni seguenti possono essere utilizzate per valutare il grado di autonomia nell'esecuzione delle attività di vita quotidiana, tranne una. Indicare quale:**
- A** Wong-Baker
 - B** BADL
 - C** ADL
 - D** Barthel
-
- 4 B00004
- La legge 43/2006:**
- A** impone l'obbligo di iscrizione all'albo a tutti gli infermieri
 - B** abroga il mansionario
 - C** identifica il Profilo Professionale dell'infermiere
 - D** ratifica la promulgazione del primo Codice Deontologico dell'infermiere
-
- 5 B00005
- Indicare il significato del termine "anasarca":**
- A** edema massivo e generalizzato
 - B** perdita o riduzione delle dimensioni o dell'attività fisiologica di una parte del corpo
 - C** assenza di tutte le sensazioni normali, soprattutto della sensibilità al dolore
 - D** perdita del controllo dei muscoli dell'eloquio che porta ad incapacità ad articolare le parole
-
- 6 B00006
- I valori normali di glicemia a digiuno:**
- A** sono compresi fra 70 e 110 mg/dl
 - B** possono raggiungere valori fino a 140 mg/dl
 - C** sono compresi fra 30 e 70 mg/dl
 - D** non sono definiti universalmente, ma vanno valutati caso per caso
-

-
- 7 **Un assistito presenta un Indice di Massa Corporea (o BMI) pari a 22,5 kg/m². In base al dato sopra riportato, l'assistito può essere definito:** B00007
- A** normopeso
 - B** sottopeso
 - C** obeso
 - D** sovrappeso
-
- 8 **Quale fra i seguenti principi attivi identifica un farmaco diuretico?** B00008
- A** Furosemide
 - B** Cefazolina
 - C** Fluoxetina
 - D** Nifedipina
-
- 9 **Ad un soggetto che presenta ipertensione arteriosa, dovrà essere consigliata una dieta:** B00009
- A** iposodica
 - B** iperproteica
 - C** a elevato contenuto di lipidi
 - D** ipocalorica
-
- 10 **Quale teorica dell'assistenza ha formulato il "Modello delle Prestazioni Infermieristiche"?** B00010
- A** Marisa Cantarelli
 - B** Florence Nightingale
 - C** Hildegard Peplau
 - D** Callista Roy
-
- 11 **Il catetere di Tenckhoff:** B00011
- A** è un catetere peritoneale, utilizzato per i trattamenti di dialisi peritoneale
 - B** è un tipo di catetere vescicale che permette la rilevazione della temperatura corporea interna tramite apposita sonda
 - C** è un catetere venoso periferico di piccolo calibro utilizzato sul paziente pediatrico
 - D** è una sonda naso-gastrica utilizzata per la somministrazione della nutrizione enterale
-
- 12 **Con il termine epidemia si intende:** B00012
- A** la manifestazione frequente e localizzata – ma limitata nel tempo – di una malattia infettiva, con una trasmissione diffusa del virus
 - B** una malattia infettiva il cui agente responsabile è stabilmente presente e circola nella popolazione, manifestandosi con un numero di casi più o meno elevato ma uniformemente distribuito nel tempo
 - C** la diffusione di un agente infettivo che avviene in più continenti o comunque in vaste aree del mondo
 - D** nessuna delle altre alternative è corretta
-

-
- 13 B00013
Quale fra le seguenti scale di valutazione del dolore è la più indicata per i soggetti con deterioramento cognitivo o demenza?
A PAINAD
B Wong-Baker
C NRS
D BPS
-
- 14 B00014
Un assistito ha gruppo sanguigno AB e deve essere sottoposto a trasfusione. Potrà ricevere sangue:
A da donatori di qualsiasi gruppo
B solo da donatori di gruppo A
C da donatori di gruppo A, B o AB ma non dai donatori di gruppo O
D solo da donatori di gruppo B
-
- 15 B00015
Quale fra le seguenti molecole è un farmaco anticoagulante:
A Warfarin sodico
B Sertralina
C Ceftriaxone
D Tramadolo
-
- 16 B00016
L'emofilia è:
A una malattia rara, congenita ed ereditaria
B una malattia trasmissibile sessualmente
C una malattia infettiva contagiosa
D una patologia neurodegenerativa
-
- 17 B00017
Generalmente, la malattia di Parkinson si manifesta con:
A disturbi motori, rigidità e tremori
B immunodepressione e anemia
C anoressia e cachessia
D deficit di memoria a breve termine
-
- 18 B00018
Quale fra questi prodotti/composti disinfettanti è il maggiormente utilizzato per la potabilizzazione delle acque?
A Cloro
B Alcol e derivati
C Formaldeide
D Iodio e composti
-

19

La Kangaroo mother care o marsupio-terapia:

- A** consiste nel porre il neonato nudo a contatto con il seno materno, a diretto contatto con la cute calda della madre
- B** consiste nel posizionare il neonato nella stessa stanza di degenza della madre
- C** è la pratica che prevede l'esecuzione del primo bagnetto entro le prime 24 ore
- D** è la pratica che prevede di mantenere la placenta attaccata al neonato, senza recidere il cordone ombelicale

20

L'ittero neonatale:

- A** può essere efficacemente trattato con il ricorso alla fototerapia
- B** è sempre una situazione di urgenza che richiede l'immediata rianimazione cardiopolmonare
- C** consiste nel colorito bluastrò di cute e mucose nel neonato
- D** è caratterizzato da macchie ipostatiche in un neonato apnoico

21

Anatomicamente, il fegato è localizzato:

- A** in ipocondrio destro
- B** in ipogastrio
- C** in fossa iliaca destra
- D** in mesogastrio

22

Una persona assistita, a seguito di una lesione midollare a livello delle vertebre C3-C4, non è più in grado di mobilizzare gli arti. Come potrà essere definita la sua condizione?

- A** Tetraplegia
- B** Paraplegia
- C** Monoplegia
- D** Emiplegia

23

La vitamina C:

- A** favorisce l'assorbimento del ferro
- B** regola i livelli ematici di calcio
- C** favorisce la produzione di emoglobina
- D** permette la visione notturna e dei colori

24

I valori ematici di Sodio (Na⁺) sono pari a:

- A** 135-145 mEq/L
- B** 5,5-13,5 mEq/L
- C** 70-110 mg/dl
- D** 55-60 mmol/L

25

L'HIV:

- A** è un retrovirus
- B** è un fungo
- C** è un protozoo parassita
- D** è un batterio

26

La posizione prona:

- A** indica la posizione in cui l'assistito giace sull'addome con la testa girata da un lato
- B** indica la posizione seduta, con la testa elevata di 80°- 90° rispetto al piano del letto
- C** è la posizione distesa sul dorso
- D** è la posizione distesa sul fianco con le gambe dritte

27

Le piastrine:

- A** intervengono nella risposta coagulativa che sigilla la discontinuità nel rivestimento endoteliale
- B** sono responsabili del trasporto di ossigeno nel sangue
- C** sono componenti importanti del sistema immunitario
- D** rappresentano la matrice acquosa del sangue

28

Il sintomo principale dell'edema polmonare acuto è:

- A** dispnea
- B** emiparesi destra
- C** anoressia
- D** iperglicemia

29

La concentrazione normale di emoglobina nel sangue:

- A** è di 12-15 g/dl nella donna e 13,5-18 g/dl nell'uomo
- B** è di 4,6-6,2 milioni/mm³ nell'uomo e 4,2-5,4 milioni/mm³ nella donna
- C** è compresa fra 5000 e 10.000 unità per mm³
- D** è compresa fra 200mila e 400mila unità per mm³

30

CINAHL è:

- A** la principale banca dati bibliografica di stampo infermieristico
- B** l'acronimo che indica l'Ordine degli Infermieri
- C** il portale istituzionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità
- D** il nome del Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie Infettive europeo



Fondazione IRCCS Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

IRCCS CA' GRANDA

**concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
a tempo indeterminato e a tempo pieno din. 5 posti di
Collaboratore Professionale Sanitario –
Infermiere Cat. D**

PROVA SCRITTA 03

1

L'ematuria:

- A** indica la presenza di sangue nelle urine
- B** è l'improvvisa, quasi incontrollabile, necessità di urinare
- C** indica la minzione volontaria e frequente nelle ore notturne, dopo essersi coricati
- D** indica la presenza di materiale purulento nelle urine

2

Si definisce "bradipnea":

- A** una frequenza respiratoria inferiore a 10 atti/minuto
- B** la presenza di un polso arterioso con frequenza inferiore a 60 battiti/minuto
- C** la presenza di una frequenza respiratoria superiore a 20 atti/minuto
- D** l'assenza di respiro spontaneo

3

Tutte le scale di valutazioni seguenti possono essere utilizzate per valutare il rischio di cadute, tranne una. Indicare quale:

- A** Braden
- B** Stratify
- C** Morse
- D** Conley

4

La legge 42/1999:

- A** abroga il mansionario
- B** identifica il Profilo Professionale dell'infermiere
- C** ratifica la promulgazione del primo Codice Deontologico dell'infermiere
- D** introduce il Sistema di Educazione Continua in Medicina (ECM)

5

Indicare il significato del termine "afasia":

- A** condizione neurologica anormale, caratterizzata da alterata o assente funzione del linguaggio a causa di una lesione cerebrale
- B** assenza di immunoglobuline gamma a livello sierico, associata a una maggiore predisposizione alle infezioni
- C** difficoltà di deglutizione, associata ad alterazioni esofagee ostruttive o motorie
- D** perdita di memoria dovuta a trauma cerebrale o a grave trauma emotivo

6

Un assistito presenta valori di glicemia a digiuno pari a 135 mg/dl. La condizione riportata si definisce:

- A** iperglicemia
- B** ipoglicemia
- C** normoglicemia
- D** polifagia

C00007

- 7 I valori di Indice di Massa Corporea (o BMI) per ritenere un soggetto normopeso:
- A** sono compresi fra 18,5 e 24,9 kg/m²
 - B** possono raggiungere un valore fino a 29,9 kg/m²
 - C** devono essere inferiori a 18,5 kg/m²
 - D** devono essere superiori a 24,9 kg/m²

C00008

- 8 Quale fra i seguenti principi attivi identifica un farmaco antidolorifico?
- A** Ketorolac
 - B** Bisoprololo
 - C** Furosemide
 - D** Lansoprazolo

C00009

- 9 Ad un soggetto che presenta diabete mellito, dovrà essere consigliata una dieta:
- A** ipoglucidica
 - B** iperproteica
 - C** a elevato contenuto di liquidi
 - D** ipokaliemica

C00010

- 10 Quale teorica dell'assistenza ha declinato la teoria del Nursing Transculturale?
- A** Madeleine Leininger
 - B** Florence Nightingale
 - C** Virginia Henderson
 - D** Marisa Cantarelli

C00011

- 11 Il catetere di Swang-Ganz:
- A** è un dispositivo di monitoraggio emodinamico invasivo usato in terapia intensiva
 - B** è un tipo di catetere vescicale che permette la rilevazione della pressione intra-addominale
 - C** è un dispositivo vascolare inserito perifericamente
 - D** è una sonda naso-gastrica utilizzata per la somministrazione della nutrizione enterale

C00012

- 12 Si definisce pandemica una malattia infettiva quando:
- A** la diffusione di un agente infettivo avviene in più continenti o comunque in vaste aree del mondo
 - B** un soggetto ammalato contagia più di una persona e il numero dei casi di malattia diminuisce rapidamente in breve tempo, oltre l'atteso in una particolare area e in uno specifico intervallo temporale
 - C** si manifesta in una popolazione in cui una certa malattia non è stabilmente presente
 - D** l'agente responsabile è stabilmente presente e circola nella popolazione, manifestandosi con un numero di casi più o meno elevato ma uniformemente distribuito nel tempo

13 Quale fra le seguenti scale di valutazione del dolore è la più indicata per i bambini in età prescolare?

- ☐ A Wong-Baker
- ☐ B PAINAD
- ☐ C NRS
- ☐ D BPS

14 Un assistito ha gruppo sanguigno A e deve essere sottoposto a trasfusione. Potrà ricevere sangue:

- ☐ A da donatori di gruppo A o 0
- ☐ B solo da donatori di gruppo A
- ☐ C da donatori di gruppo A o AB
- ☐ D da donatori di gruppo A, AB o 0

15 Quale fra le seguenti molecole è un farmaco antidepressivo:

- ☐ A Sertralina
- ☐ B Warfarin sodico
- ☐ C Ceftriaxone
- ☐ D Allopurinolo

16 La Corea di Huntington è:

- ☐ A una patologia neurodegenerativa
- ☐ B una malattia infettiva
- ☐ C una malattia cronica prevenibile
- ☐ D una malattia sessualmente trasmessa

17 Inizialmente la sclerosi laterale amiotrofica si manifesta con:

- ☐ A spasmi muscolari e debolezza in un arto o difficoltà ad articolare la parola
- ☐ B perdita di memoria a breve o lungo termine
- ☐ C anemia e immunodepressione
- ☐ D ritenzione idrica e aumento ponderale

18 Quale fra i seguenti antisettici deve essere utilizzato con cautela nelle persone affette da iperfunzionalità tiroidea diagnosticata per il rischio di assorbimento sistemico?

- ☐ A Iodopovidone
- ☐ B Clorexidina
- ☐ C Alcol etilico
- ☐ D Perossido di idrogeno

-
- 19 **Indicare quale fra le seguenti affermazioni rispetto alla pratica dello skin-to-skin fra madre e neonato è ERRATA:** C00019
- A** deve essere sconsigliata perché favorisce la trasmissione della flora batterica residente dalla cute materna a quella del neonato, con il rischio di trasmettere infezioni da contatto
 - B** favorisce il benessere psicofisico e relazionale del neonato e pone le condizioni ideali per favorire l'allattamento al seno a richiesta
 - C** riduce i tempi di permanenza del neonato se in incubatrice, favorendo la creazione di un ambiente più rispettoso dei suoi ritmi e bisogni
 - D** riduce l'ansia materna, facilitando l'apprendimento delle modalità di accudimento del neonato
-
- 20 **Secondo le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'allattamento materno al seno:** C00020
- A** è raccomandato in maniera esclusiva fino al sesto mese di vita del neonato
 - B** non ha alcun effetto protettivo nei confronti delle infezioni
 - C** può essere proposto come alternativa all'allattamento con latte in formula, che è invece consigliato come prima scelta
 - D** può essere proposto esclusivamente per i neonati sani
-
- 21 **Anatomicamente, la vescica è localizzata:** C00021
- A** in ipogastrio
 - B** in fossa iliaca destra
 - C** in epigastrio
 - D** in mediastino
-
- 22 **Una persona assistita, a seguito di una lesione midollare a livello delle vertebre T3-T4, non è più in grado di mobilizzare gli arti inferiori. Come potrà essere definita la sua condizione?** C00022
- A** Paraplegia
 - B** Emiplegia
 - C** Monoplegia
 - D** Tetraplegia
-
- 23 **La vitamina K:** C00023
- A** permette la sintesi dei fattori della coagulazione
 - B** regola i livelli ematici di calcio
 - C** favorisce la produzione di emoglobina
 - D** permette la visione notturna e dei colori
-
- 24 **I valori ematici di cloro (Cl⁻) sono pari a:** C00024
- A** 95 - 105 mEq/L
 - B** 700/1100 mg/dl
 - C** 3,5 - 4,5 mEq/L
 - D** 1 e 2 mg/dlmg/Le
-

25

C00025

Il SARS-COV-2:

- A** è un virus a RNA
- B** è un fungo
- C** è un protozoo parassita
- D** è un batterio

26

C00026

La posizione di Fowler:

- A** indica la posizione seduta, con la testa elevata di 80°- 90° rispetto al piano del letto
- B** indica la posizione in cui l'assistito giace sull'addome con la testa girata da un lato
- C** è la posizione distesa sul dorso
- D** è la posizione distesa sul fianco con le gambe dritte

27

C00027

I globuli rossi:

- A** sono responsabili del trasporto di ossigeno nel sangue
- B** intervengono nella risposta coagulativa che sigilla la discontinuità nel rivestimento endoteliale
- C** sono componenti importanti del sistema immunitario
- D** rappresentano la matrice acquosa del sangue

28

C00028

Il sintomo tipico della cirrosi epatica è:

- A** ittero
- B** emiparesi destra
- C** dolore toracico
- D** faringodinia

29

C00029

La concentrazione normale di globuli bianchi (leucociti) nel sangue:

- A** è compresa fra 5000 e 10.000 unità per mm^3
- B** è di 4,6-6,2 milioni/ mm^3 nell'uomo e 4,2-5,4 milioni/ mm^3 nella donna
- C** è di 12-15 g/dl nella donna e 13,5-18 g/dl nell'uomo
- D** è compresa fra 200mila e 400mila unità per mm^3

30

C00030

PsycInfo è:

- A** una banca dati contenente letteratura su argomenti di stampo psicologico/psichiatrico
- B** il prontuario farmaceutico dedicato agli antibiotici
- C** il portale istituzionale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dedicato alla ricerca nel campo pediatrico
- D** il manuale dei disturbi e delle malattie neurodegenerative



TRACCE PROVA PRATICA

Come di seguito riportate:





Fondazione IRCCS Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico

Sistema Socio Sanitario




Regione
Lombardia

IRCCS CA' GRANDA

**concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
a tempo indeterminato e a tempo pieno din. 5 posti di
Collaboratore Professionale Sanitario –
Infermiere Cat. D**

PROVA PRATICA 01

-
- 1 D00001
- Nell'esecuzione di un elettrocardiogramma, l'elettrodo precordiale V1 deve essere posizionato:**
- A** nel quarto spazio intercostale sul margine sternale destro
 - B** nel secondo spazio intercostale sulla linea ascellare destra
 - C** nel settimo spazio intercostale sulla linea emiclaveare sinistra
 - D** sul braccio sinistro, a livello del polso
-
- 2 D00002
- Rispetto alla somministrazione di emoderivati, indicare la risposta corretta.**
- A** Prima di iniziare la trasfusione, è necessario rilevare i parametri vitali dell'assistito
 - B** La trasfusione di piastrine deve essere somministrata molto lentamente, in almeno 4 o 5 ore
 - C** Provenendo direttamente dalla Banca del Sangue, non è necessario verificare la corrispondenza di nome e gruppo sanguigno del paziente sulla sacca
 - D** La trasfusione non deve mai essere interrotta, ma solo rallentata in caso di reazione trasfusionale
-
- 3 D00003
- Indicare la risposta corretta rispetto alla somministrazione dei farmaci tramite iniezione intradermica.**
- A** La formazione di un piccolo pomfo è indice della corretta somministrazione del farmaco nel derma
 - B** L'angolazione dell'ago deve essere pari a 30° - 45° rispetto al sito di introduzione nella cute
 - C** Dopo aver rimosso l'ago, è necessario massaggiare o strofinare vigorosamente la cute
 - D** Prima di applicare la pressione sullo stantuffo, è necessario eseguire la manovra di Lesser
-
- 4 D00004
- Si deve preparare una soluzione di Amuchina al 5%. Quanti ml di Amuchina occorrono per preparare 500 ml di soluzione?**
- A** 25 ml
 - B** 100 ml
 - C** 0,5 ml
 - D** 10 ml
-
- 5 D00005
- La signora Antonia deve assumere furosemide 160 mg per os. La confezione a disposizione in Unità Operativa è in compresse da 40 mg per compressa. Quante compresse dovranno essere somministrate alla signora Antonia?**
- A** 4
 - B** 8
 - C** 3
 - D** 2
-



- 6 Rispondere al seguente quesito facendo riferimento alla FIGURA VT 59 D00006
 Il seguente tracciato elettrocardiografico mostra:
 A una fibrillazione ventricolare
 B un infarto miocardico con sopraslivellamento del tratto ST
 C un'asistolia
 D un ritmo sinusale
-
- 7 Nella gestione del catetere vescicale a permanenza, per prevenire le infezioni alle vie urinarie, la sacca di raccolta: D00007
 A deve essere sterile
 B deve essere mantenuta a contatto con il pavimento
 C deve essere sostituita quotidianamente
 D può essere svuotata, lavata e successivamente riposizionata
-
- 8 Nella defibrillazione cardiaca in emergenza: D00008
 A è necessario evitare di applicare le placche sui cerotti transdermici eventualmente presenti sul torace
 B è necessario applicare le placche direttamente a contatto con i vestiti della persona
 C nei portatori di pacemaker, le placche devono essere posizionate direttamente sopra il dispositivo impiantato
 D lo shock elettrico va erogato immediatamente, anche se l'assistito ha la cute bagnata
-
- 9 Riguardo alla raccolta di un campione di espettorato per esame colturale, indicare la risposta corretta. D00009
 A È necessario evitare l'introduzione di materiale salivare nel contenitore durante la raccolta del campione
 B Non è necessario che il contenitore sia sterile al suo interno
 C Durante la raccolta del campione si devono indossare i guanti sterili
 D Il campione di espettorato deve sempre essere raccolto la sera, prima di coricarsi

FIGURA VT 60

APERTURA DEGLI OCCHI		PUNTEGGIO
Spontanea		4
Alla parola		3
Al dolore		2
Nessuna		1
Non testabile		0
RISPOSTA VERBALE		
Orientata		5
Confusa		4
Inappropriata		3
Suoni incomprensibili		2
Nessuna		1
Non testabile		0
MOVIMENTI		
MOVIMENTI	RISPOSTA	
Obediente		6
Localizza il dolore		5
Retrazione al dolore		4
Pressione al dolore (accumulo)		3
Estensione al dolore		2
Nessuna		1
Non testabile		0
Punteggio totale		15

10

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento alla FIGURA VT 60
La figura seguente riporta una scala di valutazione. Indicare quale.

D00010

Clicca qui per visualizzare la figura in un'altra finestra:

- ☐ A Glasgow Coma Scale
- ☐ B Scala Stratify
- ☐ C Wong-Baker faces
- ☐ D Scala di Braden



Fondazione IRCCS Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

IRCCS CA' GRANDA

**concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
a tempo indeterminato e a tempo pieno din. 5 posti di
Collaboratore Professionale Sanitario –
Infermiere Cat. D**

PROVA PRATICA 02

E00001

- 1 **Nell'esecuzione di un elettrocardiogramma, l'elettrodo precordiale V4 deve essere posizionato:**
- A** nel quinto spazio intercostale sulla linea emiclaveare sinistra
 - B** nel secondo spazio intercostale sulla linea ascellare destra
 - C** sull'arto inferiore sinistro, a livello della caviglia
 - D** sul braccio sinistro, a livello del polso

E00002

- 2 **Nel caso in cui, durante la trasfusione di emoderivati, in un assistito precedentemente apiretico, si verificasse febbre con brivido, è necessario:**
- A** interrompere immediatamente la trasfusione e mantenere pervio l'accesso venoso, infondendo soluzione fisiologica
 - B** rallentare la trasfusione, senza mai interromperla, fino al completamento della sacca
 - C** somministrare contemporaneamente antipiretici per via endovenosa, sulla stessa linea infusiva della trasfusione
 - D** posizionare un altro accesso venoso e, senza interrompere la trasfusione, procedere alla somministrazione di antibiotici per via endovenosa

E00003

- 3 **Indicare la risposta corretta rispetto alla somministrazione dei farmaci tramite iniezione sottocutanea.**
- A** L'ago deve essere inserito rapidamente nella cute, con un angolo compreso tra 45° e 90°
 - B** Deve sempre essere eseguita la tecnica del tratto Z, prima dell'inserimento dell'ago
 - C** Nel caso in cui si somministri eparina a basso peso molecolare in siringa preriempita, è sempre necessario espellere completamente la bolla d'aria prima dell'iniezione
 - D** L'ago deve essere inserito rapidamente nella cute, con un angolo compreso tra 5° e 15°

E00004


- 4 **Quanti ml di disinfettante puro sono necessari per preparare un litro di soluzione al 10%?**
- A** 100 ml
 - B** 25 ml
 - C** 0,1 ml
 - D** 50 ml

E00005

- 5 **Se a una persona vengono somministrati 500 mg di eritromicina ogni 8 ore, quanti grammi di farmaco assumerà in 24 ore?**
- A** 1,5 g
 - B** 150 g
 - C** 0,150 g
 - D** 500 g



- 6 Rispondere al seguente quesito facendo riferimento alla FIGURA VT 61 E00006
 Il seguente tracciato elettrocardiografico mostra:
A un infarto miocardico con sopraslivellamento del tratto ST
B una fibrillazione ventricolare
C un'asistolia
D un ritmo sinusale
-
- 7 Il cateterismo vescicale a permanenza **NON** è indicato in una delle seguenti situazioni: E00007
A per la raccolta di campioni di urina sterili quando la persona può urinare spontaneamente
B per il monitoraggio della diuresi in assistiti critici o instabili emodinamicamente
C per favorire la guarigione di lesioni da pressione sacrali o perineali in soggetti incontinenti
D in caso di ritenzione urinaria acuta o ostruzione delle vie urinarie
-
- 8 Per effettuare la rianimazione cardiopolmonare (RCP): E00008
A il rapporto fra compressioni toraciche e ventilazioni è pari a 30:2
B è sempre necessario essere in almeno due operatori
C l'assistito deve essere posizionato in posizione laterale di sicurezza prima di iniziare le compressioni toraciche
D la ventilazione deve essere eseguita dopo aver posizionato il capo con il mento che tocca lo sterno
-
- 9 Riguardo all'esecuzione di un tampone naso-faringeo per esame colturale, indicare la risposta corretta. E00009
A Una volta raggiunto il rinofaringe, il tampone deve essere ruotato per circa 15 secondi prima della rimozione
B È necessario inserire il tampone nella narice, dirigendolo verso l'alto
C È necessario indossare i guanti sterili per maneggiare il materiale
D Il tampone può essere inserito solo per 2-3 cm per raccogliere un campione ritenuto idoneo




10

Rispondere al seguente quesito facendo riferimento alla FIGURA VT 62

E00010

La figura seguente riporta una scala di valutazione. Indicare quale:

- ☐ A Wong-Baker faces
- ☐ B Glasgow Coma Scale
- ☐ C Scala Stratify
- ☐ D Scala di Braden





Fondazione IRCCS Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

IRCCS CA' GRANDA

**concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
a tempo indeterminato e a tempo pieno din. 5 posti di
Collaboratore Professionale Sanitario –
Infermiere Cat. D**

PROVA PRATICA 03

1

F00001

Nell'esecuzione di un elettrocardiogramma, l'elettrodo precordiale V2 deve essere posizionato:

- A** nel quarto spazio intercostale sul margine sternale sinistro
- B** nel quinto spazio intercostale sulla linea ascellare destra
- C** nel settimo spazio intercostale sulla linea emiclaveare sinistra
- D** sul braccio sinistro, a livello del polso

2

F00002

Indicare la risposta corretta rispetto alla trasfusione di emoderivati.

- A** Le piastrine devono essere somministrate rapidamente, alla massima velocità che la persona può tollerare
- B** Il plasma fresco congelato può essere infuso direttamente dopo la consegna dalla Banca del Sangue, senza ulteriori procedure da seguire
- C** La somministrazione di emazie concentrate non richiede un controllo sulla compatibilità ABO
- D** La comparsa di prurito generalizzato è una condizione ritenuta normale in corso di trasfusione

3

F00003

Indicare la risposta corretta rispetto alla somministrazione dei farmaci tramite iniezione intramuscolare.

- A** Prima dell'inserimento dell'ago, è consigliato eseguire la tecnica del tratto Z per assicurarsi che il farmaco non fuoriesca lungo il percorso dell'ago, fino al sottocute
- B** È sempre necessario sollevare la plica cutanea e inserire l'ago sulla sommità della stessa, con angolazione pari a 45°-90°
- C** Fra le sedi di somministrazione è indicata anche l'area addominale, esclusa la regione periombelicale
- D** Il volume di farmaco che può essere iniettato per via intramuscolare va da 1 a 20 millilitri

4

F00004

Qual è la concentrazione percentuale di una soluzione che contiene 1 grammo di farmaco in 500 ml di soluzione?


- A** 0,2%
- B** 50%
- C** 10%
- D** 20 ml

5

F00005

Si deve somministrare alla signora Antonia 500 ml di soluzione fisiologica in 4 ore. Avendo a disposizione una pompa volumetrica, a quanti ml/h sarà impostata?

- A** 125 ml/h
- B** 300 ml/h
- C** 10 ml/h
- D** 25 ml/h



- 6 Rispondere al seguente quesito facendo riferimento alla FIGURA VT 63 F00006
 Il seguente tracciato elettrocardiografico mostra:
 A un ritmo cardiaco indotto dalla stimolazione di un pacemaker
 B una fibrillazione ventricolare
 C un'asistolia
 D un ritmo sinusale
-
- 7 Nel cateterismo vescicale a permanenza è indicato: F00007
 A mantenere il sistema di drenaggio a circuito chiuso
 B posizionare la sacca di raccolta al di sopra del livello della vescica
 C svuotare la sacca di raccolta solo se completamente piena
 D per eseguire prelievi di urina, disconnettere la sacca di raccolta dal catetere vescicale
-
- 8 Nella rianimazione cardiopolmonare (RCP), le compressioni toraciche: F00008
 A devono essere eseguite nella misura di 30 per ciclo, al ritmo di 100 compressioni al minuto
 B non devono mai essere eseguite prima dell'arrivo del defibrillatore e dell'analisi del ritmo cardiaco
 C devono essere eseguite in rapporto 50:1 con le ventilazioni
 D devono abbassare lo sterno di almeno 10-20 centimetri
-
- 9 Riguardo alla raccolta di un campione di urina per esame culturale, indicare la risposta corretta. F00009
 A È necessario evitare di toccare i bordi o l'interno del contenitore sterile per non contaminare il campione
 B È sempre necessario posizionare un catetere vescicale
 C Durante la raccolta del campione è necessario indossare i guanti sterili
 D Il campione di urina deve sempre essere raccolto la sera, prima che l'assistito si corichi


Scala di Braden Quesito del quesito a. Qualche volta b. Spesso c. Sempre d. Mai	Scala di Glasgow Quesito del quesito a. Qualche volta b. Spesso c. Sempre d. Mai	Scala di Stratify Quesito del quesito a. Qualche volta b. Spesso c. Sempre d. Mai	Scala di Wong-Baker Quesito del quesito a. Qualche volta b. Spesso c. Sempre d. Mai
Scala di Braden Quesito del quesito a. Qualche volta b. Spesso c. Sempre d. Mai	Scala di Glasgow Quesito del quesito a. Qualche volta b. Spesso c. Sempre d. Mai	Scala di Stratify Quesito del quesito a. Qualche volta b. Spesso c. Sempre d. Mai	Scala di Wong-Baker Quesito del quesito a. Qualche volta b. Spesso c. Sempre d. Mai
Scala di Braden Quesito del quesito a. Qualche volta b. Spesso c. Sempre d. Mai	Scala di Glasgow Quesito del quesito a. Qualche volta b. Spesso c. Sempre d. Mai	Scala di Stratify Quesito del quesito a. Qualche volta b. Spesso c. Sempre d. Mai	Scala di Wong-Baker Quesito del quesito a. Qualche volta b. Spesso c. Sempre d. Mai
Scala di Braden Quesito del quesito a. Qualche volta b. Spesso c. Sempre d. Mai	Scala di Glasgow Quesito del quesito a. Qualche volta b. Spesso c. Sempre d. Mai	Scala di Stratify Quesito del quesito a. Qualche volta b. Spesso c. Sempre d. Mai	Scala di Wong-Baker Quesito del quesito a. Qualche volta b. Spesso c. Sempre d. Mai

- 10 Rispondere al seguente quesito facendo riferimento alla FIGURA VT 64
La figura seguente riporta una scala di valutazione. Indicare quale.

F00010

Clicca qui per visualizzare la figura in un'altra finestra:

- ☐ A Scala di Braden
- ☐ B Glasgow Coma Scale
- ☐ C Scala Stratify
- ☐ D Wong-Baker faces





TRACCE PROVA ORALE

PRIMO TURNO 19.04.2023:

QUESITO N. 1: Glasgow Come Scale: descrizione e utilizzo

QUESITO N. 2: Assistenza infermieristica al paziente nel postoperatorio

QUESITO N. 3: Modalità di prevenzione della trombosi venosa profonda

QUESITO N. 4: Cos'è l'incontinenza urinaria e come può essere gestita?

QUESITO N. 5: Rilevazione della temperatura corporea: sedi e modalità

QUESITO N. 6: Cos'è la CPAP e quali sono le indicazioni per l'utilizzo?

QUESITO N. 7: Catetere venoso periferico e catetere venoso centrale: analogie e differenze

QUESITO N. 8: Che cos'è il test dell'acqua e quando viene utilizzato?

QUESITO N. 9: ECG a 12 derivazioni: dove posizionare gli elettrodi?

QUESITO N. 10: Quali sono le sedi elettive per la somministrazione di insulina?

QUESITO N. 11: Precauzioni da adottare nella persona incosciente con vomito.

QUESITO N. 12: Cosa si intende per "cure palliative"?

QUESITO N. 13: La posizione di Trendelenburg: cos'è e quando è indicata.

QUESITO N. 14: Infezione da C. Difficilis: modalità di gestione

QUESITO N. 15: Che cos'è il PAP test e quando viene utilizzato?

QUESITO N. 16: Colica renale: sintomi e modalità di trattamento.

QUESITO N. 17: Intradermoreazione di Mantoux: che cos'è e come si esegue?

QUESITO N. 18: Assistenza infermieristica alla persona in terapia con farmaci anticoagulanti

QUESITO N. 19: Da cosa è caratterizzato lo shock ipovolemico?

QUESITO N. 20: Anuria: definizione

QUESITO N. 21: Illustrare i sistemi di monitoraggio della pressione arteriosa

SECONDO TURNO 19.04.2023:





QUESITO N. 1: Segni e sintomi dell'infezione alle vie urinarie

QUESITO N. 2: Preparazione della persona all'intervento chirurgico

QUESITO N. 3: Indicare le regole per una corretta somministrazione della terapia farmacologica

QUESITO N. 4: Assistenza infermieristica alla persona con infarto

QUESITO N. 5: Cosa si intende per "placebo"?

QUESITO N. 6: Segni e sintomi della febbre

QUESITO N. 7: Effetti collaterali della terapia con cortisone

QUESITO N. 8: Gestione dei farmaci stupefacenti

QUESITO N. 9: Modalità di prevenzione delle lesioni da pressione

QUESITO N. 10: Quali controlli devono essere eseguiti nella somministrazione di un'emotrasfusione

QUESITO N. 11: Emocultura: materiale e modalità di esecuzione

QUESITO N. 12: Modalità di prevenzione delle cadute

QUESITO N. 13: Quali DPI utilizzare nell'assistenza a una persona affetta da malattie trasmissibili per via aerea?

QUESITO N. 14: Come si definisce l'incapacità a deglutire e come può essere trattata?

QUESITO N. 15: Che cos'è la PEG e quali sono le modalità di gestione?

QUESITO N. 16: Assistenza alla donna sottoposta a mastectomia.

QUESITO N. 17: Modalità di somministrazione dell'eparina a basso peso molecolare.

QUESITO N. 18: Che cos'è il bilancio idrico e quando è indicato eseguirlo?

QUESITO N. 19: Quali indicazioni fornire all'assistito, per l'esecuzione di urino coltura a mitto intermedio?

QUESITO N. 20: Basic Life Support and Defibrillation: descrizione

QUESITO N. 21: Principali effetti collaterali della somministrazione di farmaci antitumorali.

TERZO TURNO 19.04.2023:

QUESITO N. 1: I farmaci LASA: cosa sono e come devono essere gestiti.

QUESITO N. 2: Contenzione: definizione e alternative

QUESITO N. 3: Quali interventi infermieristici attuare in caso di caduta di un paziente?

QUESITO N. 4: Cateterismo vescicale a scopo terapeutico: che caratteristiche deve avere un catetere vescicale per l'esecuzione di lavaggio vescicali?

QUESITO N. 5: Controlli da effettuare nell'assistito sottoposto a terapia diuretica.





QUESITO N. 6: Ipotensione: sintomi e modalità di trattamento

QUESITO N. 7: Cos'è la malnutrizione e come può essere valutata?

QUESITO N. 8: Posizione di sicurezza: cos'è e quando è necessario farla assumere?

QUESITO N. 9: Fornire la definizione del termine "screening" e fornire alcuni esempi.

QUESITO N. 10: Prevenzione delle malattie cardiovascolari: educazione sanitaria alla persona

QUESITO N. 11: Ossigenoterapia: presidi e modalità di gestione

QUESITO N. 12: Cos'è la ritenzione urinaria e come può essere gestita?

QUESITO N. 13: Illustrare la stadiazione delle lesioni da pressione

QUESITO N. 14: Assistenza alla persona con edema polmonare acuto

QUESITO N. 15: Indicare segni e sintomi della disidratazione

QUESITO N. 16: Nutrizione enterale: modalità di somministrazione

QUESITO N. 17: Emogasanalisi: cos'è e a cosa serve?

QUESITO N. 18: Che cos'è e cosa contiene il Codice Deontologico dell'Infermiere?

QUESITO N. 19: Assistenza infermieristica al bambino con diarrea

QUESITO N. 20: TSO: cos'è e quali sono i requisiti per attuarlo

QUESITO N. 21: Quali valutazioni eseguire in un assistito intubato?

PRIMO TURNO 20.04.2023:

QUESITO N. 1: Raccomandazione n.1 del Ministro della Salute sulla gestione delle soluzioni contenenti potassio concentrato: quali indicazioni per la somministrazione?

QUESITO N. 2: Che cos'è un evento sentinella?

QUESITO N. 3: Modalità di raccolta di un campione di urina sterile da catetere vescicale.

QUESITO N. 4: Ipotermia: sintomi e modalità di trattamento

QUESITO N. 5: Descrivere la catena delle infezioni

QUESITO N. 6: Prevenzione dei rischi legati alla somministrazione di ossigenoterapia.

QUESITO N. 7: Modalità di valutazione del rischio di lesioni da pressione

QUESITO N. 8: Modalità di prevenzione della stipsi

QUESITO N. 9: Assistenza Infermieristica alla persona con dolore toracico acuto





QUESITO N. 10: Come stimare la lunghezza di inserimento del sondino naso-gastrico?

QUESITO N. 11: Precauzioni da adottare per prevenire il sovraccarico della colonna vertebrale dell'operatore durante la mobilizzazione degli assistiti

QUESITO N. 12: Il PICC: cos'è e quando si utilizza?

QUESITO N. 13: Triage: definizione e descrizione

QUESITO N. 14: Medicazione di una ferita chirurgica: modalità di esecuzione

QUESITO N. 15: Indicazioni e controindicazioni alla posizione prona

QUESITO N. 16: Pneumotorace: assistenza infermieristica alla persona

QUESITO N. 17: Aspetti da considerazione nella valutazione neurologica della persona

QUESITO N. 18: Assistenza al paziente con crisi epilettiche

QUESITO N. 19: La manovra di Heimlich: cos'è e a cosa serve?

QUESITO N. 20: Preparazione della persona alla colonscopia

QUESITO N. 21: Definizione e trattamento dell'iperglicemia

SECONDO TURNO 20.04.2023:

QUESITO N. 1: Definizione e trattamento dell'ipoglicemia

QUESITO N. 2: Sindrome da allettamento: cos'è e quali sono le conseguenze?

QUESITO N. 3: Modalità di prevenzione delle reazioni avverse trasfusionali da incompatibilità AB0.

QUESITO N. 4: Assistito sottoposto a dialisi: educazione alimentare

QUESITO N. 5: Assistenza al paziente con vomito

QUESITO N. 6: Paziente con decadimento cognitivo: quali le modalità per garantirne la sicurezza in ospedale

QUESITO N. 7: Globo vescicale: definizione e modalità di trattamento

QUESITO N. 8: Assistenza al paziente con ictus

QUESITO N. 9: La tricotomia: definizione e modalità di esecuzione.

QUESITO N. 10: Modalità di contenimento del rischio cadute

QUESITO N. 11: Catetere arterioso: cos'è e per che cosa si utilizza?

QUESITO N. 12: La Nutrizione Parenterale Totale: cos'è e quando si usa

QUESITO N. 13: Quali sono le alterazioni diuresi?

QUESITO N. 14: Quali sono le complicanze della disfagia?





QUESITO N. 15: Che cos'è l'ipotensione ortostatica e come può essere prevenuta/gestita?

QUESITO N. 16: La consegna infermieristica: modalità e contenuti

QUESITO N. 17: Che cos'è la cianosi e quando può insorgere?

QUESITO N. 18: La scala di Wong-Baker: descrizione e utilizzo.

QUESITO N. 19: Valutazioni da eseguire nella persona che presenta tosse

QUESITO N. 20: Vantaggi e svantaggi nell'utilizzo del foglio unico di terapia digitale

QUESITO N. 21: Sondino nasogastrico a scopo decompressivo

QUESITO N. 22: Cos'è il sistema ECM e perché è importante?

QUESITO N. 23: Modalità di comunicazione con la persona tracheostomizzata

QUESITO N. 24: Che cos'è l'idrocolloide e quando si usa?

QUESITO N. 25: Rilevazione della pressione venosa centrale: posizionamento dell'assistito e modalità di esecuzione

QUESITO N. 26: Che cos'è la mucosite, in che soggetti insorge e come può essere trattata?

