



Dipartimento Area Medica
SC Gastroenterologia ed Endoscopia - Direttore: Prof. Flavio Caprioli
SS Endoscopia Digestiva - Responsabile: Dr. Emanuele Dabizzi
Tel. 02 5503.4091 E-mail: endoscopiadigestiva@policlinico.mi.it

PREPARAZIONE PER ENTEROSCOPIA CON VIDEOCAPSULA ENDOSCOPICA

Gentili Utenti,

di seguito vi forniamo alcune informazioni generali e le istruzioni per preparare adeguatamente l'intestino all'enteroscopia con microcamera ingeribile .

Farmaci

Gli unici farmaci certamente da evitare nei giorni precedenti la colonscopia sono i prodotti contenenti ferro da sospendere almeno 5 giorni prima l'esecuzione dell'esame.

Per il resto, potete continuare ad assumere tutti gli altri farmaci con i quali siete in cura anche il mattino stesso dell'esame almeno 1 ora prima dell'esame.

Il giorno dell'appuntamento

Si raccomanda abbigliamento comodo con pantaloni morbidi in vita, possibilmente senza cintura, e una maglietta/canottiera di cotone (verranno applicate una cintura in vita ed un registratore a tracolla che il paziente dovrà indossare per circa 12-15 ore)

L'esame viene effettuato in ambulatorio al mattino, una volta assunta la capsula e posizionati cintura e registratore il paziente sarà libero di rientrare al domicilio, ma dovrà ritornare in ospedale la sera o la mattina successiva per il recupero di cintura e registratore

La preparazione intestinale alla videocapsula con microcamera ingeribile.

Qui vi sono indicate 3 preparazioni intestinali per colonscopia tra cui scegliere: PLENVU, CLENSIA e SELG 1000. TUTTE hanno simile sicurezza ed efficacia e TUTTE possono essere acquistate in farmacia. La preparazione split è da preferire; in caso di difficoltà logistiche alla sua esecuzione può essere eseguita una preparazione il giorno prima dell'esame.

Al di là del fatto che SE SIETE MALATI DI FENILCHETONURIA O FAVISMO NON DOVETE assolutamente usare il PLENVU, per il resto le preparazioni sono ugualmente sicure ed efficaci; esse differiscono solo per il volume di liquido da ingerire, che è di 1 litro per il PLENVU, di 2 litri per il CLENSIA e per il SELG ESSE. Potete quindi decidere in base a questi parametri la Vostra preferenza o in base a Vostre esperienze precedenti.

Consigliamo di assumere le preparazioni in acqua fredda, mantenendole in frigo nei momenti di pausa, così da renderle più palatabili. In tutti i casi compariranno scariche di diarrea sempre più liquide più o meno precoci.

È però assolutamente importante che seguiate con molta precisione le specifiche istruzioni.

Cordiali saluti

Il Direttore

Prof Flavio Caprioli





Dipartimento Area Medica

SC Gastroenterologia ed Endoscopia - Direttore: Prof. Flavio Caprioli

SS Endoscopia Digestiva - Responsabile: Dr. Emanuele Dabizzi

Tel. 02 5503.4091 E-mail: endoscopiadigestiva@policlinico.mi.it

ENTEROSCOPIA CON VIDEOCAPSULA ENDOSCOPICA PREPARAZIONI SPLIT:

PREPARAZIONE SPLIT PER ENTEROSCOPIA CON VIDEOCAPSULA ENDOSCOPICA CON PLENVU®

- Non assumere frutta e verdura nei 3 giorni precedenti l'esame
- Sospendere assunzione di ferro per bocca nei 5 giorni precedenti l'esame.
- Il giorno prima dell'esame:
 - Colazione normale e pranzo leggero entro le ore 12:00
 - Poi dieta a base di liquidi chiari (brodo oppure the, camomilla zuccherati...)
- Alle ore **20:00** bere LENTAMENTE la **DOSE 1** (meglio fresca, messa in frigo dopo completo scioglimento) in circa 30 minuti. Nei 30 minuti successivi bere almeno un altro MEZZO LITRO (500 ml) di liquidi chiari (es. acqua, thè, camomilla). E' possibile bere ulteriori liquidi chiari se si avverte lo stimolo della sete.
- Il giorno della videocapsula
 - **3 ore PRIMA dell'esame** bere LENTAMENTE la **DOSE 2** in circa 45 minuti: MEZZO BICCHIERE OGNI 10 MINUTI (meglio fresca, messa in frigo dopo completo scioglimento). Nei 30 minuti successivi bere almeno un altro MEZZO LITRO (500 ml) di liquidi chiari (es. acqua, thè, camomilla). E' possibile bere ulteriori liquidi chiari se si avverte lo stimolo della sete.

N.B. NON INVERTIRE L'ORDINE DI ASSUNZIONE DELLE DUE DOSI.

Ogni confezione di PLENVU contiene 2 dosi:

DOSE 1: una busta singola

DOSE 2: due bustine diverse, A e B, incollate tra loro e da utilizzare insieme

Come preparare PLENVU Dose 1:

1. Versare il contenuto della Dose 1 in un recipiente che possa contenere ½ litro di liquido.
2. Aggiungere acqua fino a raggiungere ½ litro e mescolare fino a che tutta la polvere sia completamente sciolta.

Come preparare PLENVU Dose 2:

1. Versare il contenuto della Bustina A e della Bustina B in un recipiente che possa contenere ½ litro di liquido.
2. Aggiungere acqua fino a raggiungere ½ litro e mescolare fino a che tutta la polvere sia completamente sciolta.

- Interrompere l'assunzione di tutti i liquidi 2 ore prima dell'esame.

N.B. NON ASSUMERE PLENVU SE SI E' AFFETTI DA FAVISMO O FENILCHETONURIA

ISTRUZIONI

Si raccomanda abbigliamento comodo con pantaloni morbidi in vita, possibilmente senza cintura, e una maglietta/canottiera di cotone (verranno applicate una cintura in vita ed un registratore a tracolla che il paziente dovrà indossare per circa 12-15 ore)

L'esame viene effettuato in ambulatorio al mattino, una volta assunta la capsula e posizionati cintura e registratore il paziente sarà libero di rientrare al domicilio, ma dovrà ritornare in ospedale la sera o la mattina successiva per il recupero di cintura e registratore





Dipartimento Area Medica

SC Gastroenterologia ed Endoscopia - Direttore: Prof. Flavio Caprioli

SS Endoscopia Digestiva - Responsabile: Dr. Emanuele Dabizzi

Tel. 02 5503.4091 E-mail: endoscopiadigestiva@policlinico.mi.it

PREPARAZIONE SPLIT PER ENTEROSCOPIA CON VIDEOCAPSULA ENDOSCOPICA CON CLENSIA®

- Non assumere frutta e verdura nei 3 giorni precedenti l'esame.
- Sospendere assunzione di ferro per bocca nei 5 giorni precedenti l'esame.
- Il giorno prima dell'esame:
 - Colazione normale e pranzo leggero entro le ore 12:00
 - Poi dieta a base di liquidi chiari (brodo oppure the, camomilla zuccherati...)
- Alle ore 21:00 bere LENTAMENTE la **DOSE 1** (meglio fresca, messa in frigo dopo completo scioglimento) in circa 30 minuti. Nei 30 minuti successivi bere almeno un altro MEZZO LITRO (500 ml) di liquidi chiari (es. acqua, thè, camomilla). E' possibile bere ulteriori liquidi chiari se si avverte lo stimolo della sete.
- **3 ore PRIMA dell'esame** bere LENTAMENTE la **DOSE 2** in circa 45 minuti: MEZZO BICCHIERE OGNI 10 MINUTI (meglio fresca, messa in frigo dopo completo scioglimento). Nei 30 minuti successivi bere almeno un altro MEZZO LITRO (500 ml) di liquidi chiari (es. acqua, thè, camomilla). E' possibile bere ulteriori liquidi chiari se si avverte lo stimolo della sete.

N.B. NON INVERTIRE L'ORDINE DI ASSUNZIONE DELLE DUE DOSI.

Ogni confezione di CLENSIA contiene 2 dosi:

DOSE 1: 2 bustine A e 2 bustine B

DOSE 2: 2 bustine A e 2 bustine B

Come preparare CLENSIA Dose 1:

1. Versare il contenuto di 2 bustine A e di 2 bustine B in 1 litro di acqua fresca non gassata e mescolare bene finché la polvere si sarà sciolta completamente (soluzione limpida). Bere 2 bicchieri (=250 ml) della soluzione ogni 15-20 minuti e finire tutta la bevanda così preparata. Al termine, bere mezzo litro di liquidi chiari (acqua, the, brodo, camomilla, bevande chiare).
2. Aggiungere acqua fino a raggiungere 1 litro e mescolare fino a che tutta la polvere sia completamente sciolta.

Come preparare PLENVU Dose 2:

1. Versare il contenuto della Bustina A e della Bustina B in un recipiente che possa contenere 1 litro di liquido.
2. Aggiungere acqua fino a raggiungere 1 litro e mescolare fino a che tutta la polvere sia completamente sciolta.

- Interrompere l'assunzione di tutti i liquidi 2 ore prima dell'esame.

N.B. NON ASSUMERE CLENSIA SE SI E' AFFETTI DA FAVISMO O FENILCHETONURIA

ISTRUZIONI

Si raccomanda abbigliamento comodo con pantaloni morbidi in vita, possibilmente senza cintura, e una maglietta/canottiera di cotone (verranno applicate una cintura in vita ed un registratore a tracolla che il paziente dovrà indossare per circa 12-15 ore)

L'esame viene effettuato in ambulatorio al mattino, una volta assunta la capsula e posizionati cintura e registratore il paziente sarà libero di rientrare al domicilio, ma dovrà ritornare in ospedale la sera o la mattina successiva per il recupero di cintura e registratore





Dipartimento Area Medica
SC Gastroenterologia ed Endoscopia - Direttore: Prof. Flavio Caprioli
SS Endoscopia Digestiva - Responsabile: Dr. Emanuele Dabizzi
Tel. 02 5503.4091 E-mail: endoscopiadigestiva@policlinico.mi.it

PREPARAZIONI IL GIORNO PRIMA:

PREPARAZIONE PER ENTEROSCOPIA CON VIDEOCAPSULA ENDOSCOPICA

CON PLENVU®

- Non assumere frutta e verdura nei 3 giorni precedenti l'esame.
- Sospendere assunzione di ferro per bocca nei 5 giorni precedenti l'esame.
- Il giorno prima dell'esame:
 - Colazione normale e pranzo leggero entro le ore 12:00
 - Poi dieta a base di liquidi chiari (brodo oppure the, camomilla zuccherati...)
 - Alle ore **19:30** bere LENTAMENTE la **DOSE 1** (meglio fresca, messa in frigo dopo completo scioglimento) in circa 30 minuti. Nei 30 minuti successivi bere almeno un altro MEZZO LITRO (500 ml) di liquidi chiari (es. acqua, thè, camomilla). E' possibile bere ulteriori liquidi chiari se si avverte lo stimolo della sete.
 - Alle ore **22:30** bere LENTAMENTE la **DOSE 2** in circa 45 minuti: MEZZO BICCHIERE OGNI 10 MINUTI (meglio fresca, messa in frigo dopo completo scioglimento). Nei 30 minuti successivi bere almeno un altro MEZZO LITRO (500 ml) di liquidi chiari (es. acqua, thè, camomilla). E' possibile bere ulteriori liquidi chiari se si avverte lo stimolo della sete.

N.B. NON INVERTIRE L'ORDINE DI ASSUNZIONE DELLE DUE DOSI.

Ogni confezione di PLENVU contiene 2 dosi:

DOSE 1: una busta singola

DOSE 2: due bustine diverse, A e B, incollate tra loro e da utilizzare insieme

Come preparare PLENVU Dose 1:

1. Versare il contenuto della Dose 1 in un recipiente che possa contenere ½ litro di liquido.
2. Aggiungere acqua fino a raggiungere ½ litro e mescolare fino a che tutta la polvere sia completamente sciolta.

Come preparare PLENVU Dose 2:

1. Versare il contenuto della Bustina A e della Bustina B in un recipiente che possa contenere ½ litro di liquido.
 2. Aggiungere acqua fino a raggiungere ½ litro e mescolare fino a che tutta la polvere sia completamente sciolta.
- Interrompere l'assunzione di tutti i liquidi 2 ore prima dell'esame.

N.B. NON ASSUMERE PLENVU SE SI E' AFFETTI DA FAVISMO O FENILCHETONURIA

ISTRUZIONI

Si raccomanda abbigliamento comodo con pantaloni morbidi in vita, possibilmente senza cintura, e una maglietta/canottiera di cotone (verranno applicate una cintura in vita ed un registratore a tracolla che il paziente dovrà indossare per circa 12-15 ore)

L'esame viene effettuato in ambulatorio al mattino, una volta assunta la capsula e posizionati cintura e registratore il paziente sarà libero di rientrare al domicilio, ma dovrà ritornare in ospedale la sera o la mattina successiva per il recupero di cintura e registratore





Dipartimento Area Medica

SC Gastroenterologia ed Endoscopia - Direttore: Prof. Flavio Caprioli

SS Endoscopia Digestiva - Responsabile: Dr. Emanuele Dabizzi

Tel. 02 5503.4091 E-mail: endoscopiadigestiva@policlinico.mi.it

PREPARAZIONE PER ENTEROSCOPIA CON VIDEOCAPSULA ENDOSCOPICA CON CLENSIA®

- Non assumere frutta e verdura nei 3 giorni precedenti l'esame.
- Sospendere assunzione di ferro per bocca nei 5 giorni precedenti l'esame.
- Il giorno prima dell'esame:
 - Colazione normale e pranzo leggero entro le ore 12:00
 - Poi dieta a base di liquidi chiari (brodo oppure the, camomilla zuccherati...)
- Alle ore 19:30 bere LENTAMENTE la **DOSE 1** (meglio fresca, messa in frigo dopo completo scioglimento) in circa 30 minuti. Nei 30 minuti successivi bere almeno un altro MEZZO LITRO (500 ml) di liquidi chiari (es. acqua, thè, camomilla). E' possibile bere ulteriori liquidi chiari se si avverte lo stimolo della sete.
- **Alle ore 22:30** bere LENTAMENTE la **DOSE 2** in circa 45 minuti: MEZZO BICCHIERE OGNI 10 MINUTI (meglio fresca, messa in frigo dopo completo scioglimento). Nei 30 minuti successivi bere almeno un altro MEZZO LITRO (500 ml) di liquidi chiari (es. acqua, thè, camomilla). E' possibile bere ulteriori liquidi chiari se si avverte lo stimolo della sete.

N.B. NON INVERTIRE L'ORDINE DI ASSUNZIONE DELLE DUE DOSI.

Ogni confezione di CLENSIA contiene 2 dosi:

DOSE 1: 2 bustine A e 2 bustine B

DOSE 2: 2 bustine A e 2 bustine B

Come preparare CLENSIA Dose 1:

1. Versare il contenuto di 2 bustine A e di 2 bustine B in 1 litro di acqua fresca non gassata e mescolare bene finché la polvere si sarà sciolta completamente (soluzione limpida). Bere 2 bicchieri (=250 ml) della soluzione ogni 15-20 minuti e finire tutta la bevanda così preparata. Al termine, bere mezzo litro di liquidi chiari (acqua, the, brodo, camomilla, bevande chiare).
2. Aggiungere acqua fino a raggiungere 1 litro e mescolare fino a che tutta la polvere sia completamente sciolta.

Come preparare PLENVU Dose 2:

1. Versare il contenuto della Bustina A e della Bustina B in un recipiente che possa contenere 1 litro di liquido.
2. Aggiungere acqua fino a raggiungere 1 litro e mescolare fino a che tutta la polvere sia completamente sciolta.

- Interrompere l'assunzione di tutti i liquidi 2 ore prima dell'esame.

N.B. NON ASSUMERE CLENSIA SE SI E' AFFETTI DA FAVISMO O FENILCHETONURIA

ISTRUZIONI

Si raccomanda abbigliamento comodo con pantaloni morbidi in vita, possibilmente senza cintura, e una maglietta/canottiera di cotone (verranno applicate una cintura in vita ed un registratore a tracolla che il paziente dovrà indossare per circa 12-15 ore)

L'esame viene effettuato in ambulatorio al mattino, una volta assunta la capsula e posizionati cintura e registratore il paziente sarà libero di rientrare al domicilio, ma dovrà ritornare in ospedale la sera o la mattina successiva per il recupero di cintura e registratore





Dipartimento Area Medica

SC Gastroenterologia ed Endoscopia - Direttore: Prof. Flavio Caprioli

SS Endoscopia Digestiva - Responsabile: Dr. Emanuele Dabizzi

Tel. 02 5503.4091 E-mail: endoscopiadigestiva@policlinico.mi.it

PREPARAZIONE PER ENTEROSCOPIA CON VIDEOCAPSULA ENDOSCOPICA

CON SELG ESSE®

- Non assumere frutta e verdura nei 3 giorni precedenti l'esame.
- Sospendere assunzione di ferro per bocca nei 5 giorni precedenti l'esame.
- Il giorno prima dell'esame:
 - Colazione normale e pranzo leggero entro le ore 12:00
 - Poi dieta a base di liquidi chiari (brodo oppure the, camomilla zuccherati...)
- Alla sera dalle ore 18 assumere SELG ESSE 2 buste da 70g disciolte in 2 litri di acqua (metà della preparazione per colonscopia) in circa 2 ore
- La mattina dell'esame digiuno e alle ore 7:00 assumere Simecicone (preparazione in gocce pediatrica) mezzo flacone in un bicchiere di acqua

