



Dipartimento Area Medica

S.C. Gastroenterologia ed Endoscopia – Direttore : Prof. Flavio Caprioli

Ambulatorio di Ecografia - Segreteria: 02 55033326 - mail: gastroenterologia@policlinico.mi.it

Ambulatorio di Ecografia

Padiglione Mangiagalli Scala C, 3° piano, Via Commenda, 12 – 20122 – Milano

Referente: Dott.ssa M. Fraquelli

PREPARAZIONE ALL'ECOGRAFIA ADDOMINALE (T05)

A) Addome superiore cod. 88741:

Nelle 8 ore precedenti l'esame:

- digiuno (consentita minima quantità di acqua per assumere eventuale terapia in corso)

B) Addome completo (addome superiore + anse intestinali) cod. 88761:

Nelle 6 ore precedenti l'esame:

- digiuno da solidi con normale idratazione. Non è necessario riempire la vescica assumendo forzatamente acqua (come invece richiesto per l'ecografia addome inferiore)

C) Addome completo (addome superiore + addome inferiore) cod. 88761:

Nelle 8 ore precedenti digiuno da solidi + riempimento vescicale per valutare l'addome inferiore (Bere circa 1 L di acqua nelle 3 ore precedenti)

D) Addome inferiore (vescica, pelvi) cod. 88751:

Bere circa 1 litro di acqua nelle 3 ore precedenti l'esame

Qualora venisse richiesta l'esecuzione sia dell'addome superiore che inferiore questi esami verranno eseguiti in successione e pertanto il paziente è pregato a casa di effettuare la preparazione per l'ecografia addome superiore e di munirsi di un litro di acqua che berrà in seguito.

E) Ecografia con mezzo di contrasto cod. 8874A:

Preparazione: **vedere la preparazione A (addome superiore)**





Dipartimento Area Medica

S.C. Gastroenterologia ed Endoscopia – Direttore : Prof. Flavio Caprioli

Ambulatorio di Ecografia - Segreteria: 02 55033326 - mail: gastroenterologia@policlinico.mi.it

Quando deve essere valutato l'addome superiore:

-Nei tre giorni precedenti l'esame eliminare dalla dieta legumi, frutta con buccia, pane integrale, latticini; ridurre carboidrati (pasta e pane, comunque non integrali); non assumere bevande gassate.

- Per ridurre/ eliminare il gas intestinale si può assumere a scelta, uno dei seguenti farmaci o similari da assumere il giorno precedente l'esame e la mattina stessa dell'esame.

Per esempio:

- DicoSim 20 gocce 4 volte nel giorno precedente l'esame e 20 la mattina stessa
- GAS NORM PLUS: 1/2 compresse dopo i pasti principali;
- MYLICON: 2 compresse dopo i pasti principali;
- CARBONE VEGETALE: 1 compressa dopo i pasti principali;
- SIMECRIN: 1 compressa dopo i pasti principali

Assumere le eventuali terapie in corso secondo lo schema abituale.

Presentarsi al **Padiglione Mangiagalli, terzo piano, scala C**, portando eventuali ecografie, tac e risonanze precedenti.

